

卷一



吉慶堂







本第一冊

半  
新集山氣齋

# 重訂寶圖

國中史部

工部  
新集



女科第一善本

閩中武林鄉先生著

仁記鵬  
工校刻

# 重訂濟陰綱目

上  
洋埽葉山房藏板



濟陰綱目序

大醫者活人之事而亦殺人之機也今天下  
醫書亦繁夥矣未盡其變紙上陳言何足為  
用設沉疴當前醫士環視生之乎殺之乎曰  
殺之也何以明其然也拘泥古方以療今疾  
如此者醫殺之耳男子無論矣女子之情隱  
微難見病不自知而一委於醫醫又不能得  
其隱微望聞問無有焉一憑於脈脉其可盡



憑乎惟是妄意揣度聊復從事焉嗟乎此何等事而竟以意度之想當然乎哉然隱微亦難言矣從其隱而隱之則無乎不隱如倉公之診女子知其思欲不遂脉出魚際一寸是也從其顯而顯之則無乎不顯如婦人因夫不歸而發狂疾哭泣無時詬詈無度醫者迎而奪之拔劍砍之彼則匍伏不敢仰視久之愈矣是也岳武穆云運用之妙存乎一心兵

法也亦醫法也吾因是而又知天一生水之



法也亦醫法也吾因是而又知天一生水之  
義矣水能生人亦能殺人故禹之治水也窮  
其源而疏之因其勢而利導之自無汎濫之  
患禹非能治水也因水以治水也人能知禹  
之治水則知所以治婦女之科也故濟陰綱  
目一書其立論自調經始有綱領有原委有  
條貫有分疏一病之中三致意焉一方之設  
細詳釋焉得其隱微能盡其變使人閱之一



團生氣浮於紙上詎非活人之書哉雖曰濟  
陰實以扶陽也無陽則陰無以生無陰則陽  
無以化陽施陰化而醫道之能事畢矣吾非  
能知醫也而因醫以知醫故重為訂之以廣  
仁人之心而已雖然喻指為月指終非月讀  
者因指識月焉可也

雍正戊申年孟冬月西陵憺漪子汪淇右子

甫題於孝友堂別業



濟陰綱目凡例

一凡醫家治男子易治婦人難所以丹溪云寧治十男子不治一婦人甚言女科之難也惟茲濟陰綱目一書集百家之精華彙諸書之奧旨真千古之秘義功參大化一時之鴻寶福底坤元也

一是書理解微妙無不條分節判標榜詳明卽一圈一點俱出匠心令人一見了然至于上層批評箋釋各從本末源流分疏辯覈學者開卷既易于尋方病者得醫無



難于對症矣。

一。是編雖屬婦人。而刻其論脉。理經絡。處俱採內經。素問之精微。如某症加減某藥等。不僅女科要書。即大小諸家。細爲觀覽。咸可觸類旁通。所謂造化在手。物類聽其鑪錘。橐籥在心。乾坤亦任其旋轉耳。

一。婦人得病。種種與男子不同。其所由起。世人畧而不知。此書獨先明其病源。因何而啟。然後論脉論症。中引古方之的確。而增減其藥味。土批議論之可否。而商量其

去從此因病用藥。按脉切理。不拘于方之內也。神而明



去從此因病用藥。按脉切理。不拘于方之內也。神而明之。存乎其人。

一集內凡藥味之炮製煎熬之合法。加減之精當。各以類推。種種不同。初入門者。宜細心翫習。卽四解醫宗窮究厥中奧理。則其學自居聖功之上。而盧扁再出矣。

一是書實醫家之秘寶。因原板無存。世人每欲購求遺本。真如丹經仙錄。可思而不可得。今本坊重登梨棗。照原本不易一字。至于紙用精良。鐫皆名手。以方可壽人書。



可壽世述者不厭精工。識者自爲鑒賞。

一。此刻之後。隨有慈幼綱目。卽證治準繩之幼科也。復增  
圈點。詳加評釋。亦如是編之精。詳梓以問世。蓋濟陰所  
以扶陽地。天于焉常泰。而慈幼卽以康老。運用是咸  
亨。不佞壯志旣頽。致藉仁術。以傳婆心。熱腸未冷。願持  
垣方。下問國手。倘不棄於梁公之藥籠。或有補夫黃帝  
之赭鞭也。

康熙四年一陽月西陵愴漪子汪

洪右子父題于蠅寄



調經

論經王衝任三脉

論心脾爲經血主統

論脾胃生血

論經不調由風邪客於胞中

論三月一來爲居經

論師居寡婦異乎妻妾之治

論調經當抑氣

論調經先去病

論調經大法

論經水異色

論經候愆期

論月水多少

論月水不利

論月水不斷

論過期不止

論經病疼痛

論經病發熱

論往來寒熱



論熱八血室

論行經泄瀉

脉法

調經通用諸方

四物湯

治婦人衝任虛損月水前後不調或胎前產後一切症

簡易當歸散

治經脈不勻不痛或腰膝疼痛或月經不調

大溫經湯

治月候或來多或過期或崩或漏或經小腹痛

嚴氏抑氣散

治氣盛於血

四製香附丸

治婦女經候不調

九味香附丸

治婦人

百子歸附丸

治經種

當歸地黃丸

治血氣不和月事不勻腰腿疼痛

治經候先期方

先期湯

治先期而來宜

金匱土瓜根散

治帶下經不利小腹痛

人參養血丸

治女界弱氣血虛損常服調經

艾附暖宮丸

治經不調小腹時痛赤白帶下子宮寒冷

十味香附丸

治經候不調



治經候過期方

過期飲過期不行宜

滋血湯治心肺虛損

治經水過多方

當歸飲助陽助陰治月水

膠艾湯治勞傷氣血月水過多

丹溪方治稟弱氣不能

治經水澁少方

七沸湯治經水愆期或

四物加葵花湯治經水

四物加熟地黃當歸湯治水少而

治月水不利方

牛膝散治月水不利

牡丹散治月水不利

養榮湯治血虛恍惚驚悸

玄歸散治月經滯

歸漆丸治月水不利



治月水不斷方

止經湯

治因倦多睡少食經水淋漓或疝或赤白黃水面青黃頭眩目花四肢酸

蒲黃散

治經水不止

固經丸

治月水過多不止陰虛挾熱所致

治過期不止方

芩心丸

治四十九歲後天癸行而不止

補中芍藥湯

治月水不調崩中暴下或產後失血過多腹痛或胎動下血

桂附湯

治血

治經病疼痛方

越類散

治血氣虛寒身痛作痛

八物湯

治經將行臍腹痛

加味四物湯

治經來作疼不止

烏藥湯

治血海疼痛

加味烏藥湯

治經水欲來臍腹疼痛

澹寮者附丸

治經不調血氣刺痛腹脇膨脹

薑黃散

治血凝滯臍腹刺痛

琥珀散

治經閉心腹疼痛不可忍及產後惡血不消欲死

玄胡索散

治血氣攻刺新舊腹痛



當歸散 治久積血氣病痛小

經驗方 治臍痛不省人

三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛

交加散 治經脈不調腹痛

交加散 治月車淋瀝逐血中

交加地黃丸 治經不調血塊

瓦龍丸 治瘵血

桂枝桃仁湯 治經前感寒

柴胡丁香湯

治三十歲臨經頓先腰

小溫經湯 治經不調

沒藥除痛散

逐寒邪

治經病發熱方

逍遙散

治血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥

加味四物湯

治月水不行

六神湯

治血氣不足煩熱

治往來寒熱方

本事方

治血脈不調往來寒熱狀如勞倦

地骨皮散

治血氣兩虛寒

柴胡散

治寒熱體瘦肢節疼

七寶湯

治寒熱



柴胡四物湯

治虛勞日久  
微有寒熱

柴胡抑肝湯

治寡居獨陰無陽  
心萌而不遂寒熱如結

生地黄丸

治婦人寡婦  
寒熱如瘧

治熱入血室方

小柴胡加地黃湯

治中風發熱惡寒  
經水適來青明  
了夜夢語如見鬼

乾薑柴胡湯

治婦人傷寒  
經脈方來熱入  
血室寒熱如瘧  
狂言見鬼

牛黃膏

治熱入血室  
發狂不認人

海蛤散

治婦人傷寒  
血結胸膈

卷之二

經閉門

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

論經閉不行有三治宜補血瀉火

論經閉因肝勞血傷

論經閉因勞傷當大補脾胃

論室女經閉成勞因思慮傷心

論經閉因積冷結氣

論經閉因痰飲所隔

論經閉因利止經來

論經閉因血滯血枯



論下利經閉利止經來

論經閉總由血滯血枯

論經閉大法

脉法

治血枯經閉方

玉燭散

治胃熱善食津液燥竭以致

三和散

治勞心火旺月事不來四物合涼膈散

二黃散

治婦女經脉不通如神

二氣丸

治月經不調斷產黃瘦不喜飲食燥熱

五補丸

補諸虛安五臟堅骨養精

衛生湯

補氣血

栢子仁丸

治血虛有火經閉不通日瘦潮熱虛室女思慮經閉

澤蘭湯

治症同前

加味補中益氣湯

治飲食少血不生脾虛多產傷血或服就伐

十全大補湯

治墮胎多產傷血或服就伐之禁以致血衰氣少下行

養真湯

治經閉臍不有塊

治血澁經閉方

溫經湯

治經道不行臍寒痛脉沉緊

桂枝桃仁湯

治症同前

紅花當歸散

治婦人室女經不行瘀積腰腹痛

行經紅花湯

治婦女經阻脹痛



凌雪花散 治月水不行 發熱腹痛

土牛膝散 治婦女血 閉煩熱

琥珀散 治心膈氣悶腹 痛月信不通

萬病丸 治經阻 痛

虎寶方 治月經不 通腹中痛

和血通經丸 治經疑不行腰背 腹痛癰成血塊

大黃膏 治乾 血氣

通經丸 治月候不通 或成血痕

治痰結經閉方

丹溪方 治積痰傷經不 行夜則妄語

加味導痰湯 治經閉 軀脂

礬石丸 治經閉臍堅結痕 中有乾血下自物

瑞金散 治血氣 凝滯不行

當歸散 治血 不通

桃奴飲子 治經閉 脹滿及墜馬跌 一併瘀血停積欲成血 瘕

通經丸 治經閉 血塊疼痛

千金桃仁煎 治血 凝滯不行

斑貓通經丸 治經閉 及乾血氣

聖惠方 治月水 滯滯不快結 成瘀塊脹大欲死

一方 治形 實氣盛月 水不通屢驗

掌中金丸 治乾 血氣

一粒仙丹



通經下取方

血崩門

論崩中由傷損衝任

論血崩因虛熱

論氣陷血脫法當升舉

論血瘀腹痛法當收止

論過服寒涼法當溫補

論補中去積

論開痰行氣

論殺血心痛

論崩漏雜治

經驗簡要治崩中等證法

脉法

治血熱崩漏方

荊芥四物湯

治崩漏初起不問虛實服之立止

奇效四物湯

治肝熱血沸久而不止

河間生地黃散

治經漏紫黑脉虛洪者

涼血地黃湯

治腎水陰虛不能鎮守相火血崩者

小蘇湯

治崩色如水得溫則煩悶此陽傷陰而下血脉數小願大者逆

芎藭酒

治崩中晝夜不止



治崩中去血不止

一方治崩

金華散治血虛有熱崩不止

簡易黃芩湯治陽乘陰崩中不止

治勞傷崩漏方

膠艾四物湯治勞傷月水過多不止及胎前不安漏血傷胎

當歸芍藥湯治經漏鮮紅因勞倦脾虛氣短自汗身熱惡食倦怠帶濁

歸脾湯治思慮傷脾不能持血以致妄行或健忘驚悸不寐或心脾傷痛倦怠不食

栢子仁湯治憂思過度心傷不能藏血下血不止養血平肝湯治大怒經血暴下

治崩漏氣陷方

益母升陽湯治血脫益氣先補母以助生長諸甘藥為先陽生陰長甘能生血也

柴胡調經湯治鮮血不止項急腦痛脊強不思食

調經升陽除濕湯治漏下惡血或不調不止多水漿等證見解多不錄



治崩漏血瘀昏暈疼痛等證方

五寶散 治血崩不止昏暈不省附入法

香附子散 治血崩五色不止併治產後小

老附丸 治崩漏帶下積聚疔痛

備金散 治血崩不止

如神散 治血崩赤白帶下

立效散 治血崩腹痛

一方 同前

縮砂散 治血崩

加減固物湯 治天癸至或後至卒暴淋瀝不止若崩者或過多變生諸症者悉宜

治崩漏虛寒方

丁香膠艾湯 治心氣不足飲食不節崩漏不止尺脈弦緊而洪按之無力者

芎藭湯 治風寒冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急虛羸腹痛及胎動

斷下湯 治衝任氣虛崩漏不調每月候將來臍腹腰脚先痛食減乏力

加味四物湯 治崩漏

熟附丸 溫澁之劑



鹿茸丸

治經候過多其色黑呼吸少氣  
臍腹冷極汗出如雨尺脉微小者

治崩漏虛脫方

大千方

治崩下不止小腹痛

栢黃散

治經血不止  
涼血之劑

又方

治崩中不止結血  
片如雞肝碎爛

伏龍肝散

治傷衝任忽崩如豆汁血片五色赤  
口乾食減無力

地榆散

治崩中不止

蒲黃散

同上

震靈散

治妄

鹿茸散

治崩漏不止  
虛羸瘦損

補宮丸

治諸虛久不妊娠骨  
熱形羸崩中帶下

牡蠣丸

治月水不止  
衆藥不愈

一方

大千方名無  
比散無阿膠

血見黑則止方

以下諸方品味錯雜然總是治久崩止  
瀉之藥今各有參識觀者亦可省心

五灰散

十灰散

如聖散

當歸散



一方 治血崩  
屢效

立應散

虎珀散 一名房  
紗帽散

立效散

必效散

烏金散

香礬散

一方

止崩雜方 共二十  
五方

千金方 治婦人無  
故尿血

孫奕人方 治九竅  
出血

卷之三

赤白帶下門

論帶下則勞傷衝任

論帶下五色因風邪入於胞門

論帶下屬濕熱宛結不散

論帶下痰實宜吐下

論帶下虛寒宜溫補

論帶久枯澀宜潤補

治帶下當以壯脾胃升陽氣為主

論帶久不止當補衝厚脾



論帶下濕熱藥用正治從治之異

論帶下雜治法

論室女帶下

排膿

消瘀血

論白濁白淫

脉法

治濕熱帶下

清白散

治白帶 有

檮皮丸

治赤白帶 由濕熱者

蒼朮檮皮丸

治帶

苦練丸

治赤白帶甚 妙有加減

萬安散

治赤白帶或 如脂或臭濁

大聖萬安散

治癰疽瘰癧氣腫脹 胸滿赤白帶下虛弱瘵瘵休息刺並效

宜明導水丸

治濕熱鬱於下焦 赤白帶燥熱煩渴

治濕痰帶下方

解帶散

治濕熱白帶痰鬱 嘈雜倦怠煩熱

勝濕丸

治濕熱勝 赤白帶

側柏檮皮丸

治七情白帶脉數

四神丸

治帶下



治濕消痰飲  
治濕熱痰積下滲白帶

蒼栢槲皮丸  
肥人白帶是濕

小腸丹  
上取胸膈痰下取腸胃痰並治濕熱痰結白帶

補藥方  
治痰結白帶與前方並用

治風邪帶下方

胃風丹  
治風邪入胞中經傳臟帶下五色

小柴胡湯  
治風邪帶下五色有加法有加減法

蒼栢秦黃散  
治上有頭風下有白帶

地榆散  
治漏下五色十二帶治嘔吐下血

治虛損帶下方

衛生湯  
治帶下肝微弱腹痛

補中益氣湯  
治飲食勞倦脾胃氣弱白帶不止

六君子湯  
治胃虛有痰食必時時帶下

加味八珍湯  
治氣血兩虛帶下有加減

歸脾湯  
治思慮過傷心脾致健忘怔忡不寐意情嗜以不思飲食白帶不止

當歸澤蘭湯  
治經脈不調赤白帶下無子者

止帶丸  
補氣血溫下元清濕熱有加減法

嚴氏當歸煎  
治赤白帶下腹痛不欲食

養榮固本丸  
治赤白帶不熱不寒助陰生子

補宮丸  
治諸虛久不妊娠骨熱形瘦崩中帶下

丹溪方  
白帶黃陰虛者



千金方

治帶下脉數陰虛有熱

補真固經丸

治白帶流而不止心炮火脉極微諸藥不效有醫案

助陽湯

治白帶陰中痛控心而痛身黃皮緩身重如山陰中如水

治虛寒帶下方

元戎四物湯

治赤白帶脉沉微腹痛陰中痛

玉仙散

治赤白帶

延胡索湯

治赤白帶痛陰冷白帶

桂附湯

治白帶寒濕多悲不樂大寒有加減

當歸附子湯

治赤白帶下冷痛亦白帶下

暖宮妙應丸

治赤白帶子宮冷無子者

酒煮當歸丸

治赤白帶如小水坑厚衣猶冷小便不止

鵝頂丸

治赤白帶遇風冷乘人產後帶下亡血傷胞

白藜丸

治室女虛寒帶下純白

神仙聚寶丹

治赤白帶崩漏腹痛小寒風冷搏結積塊

茱萸湯

治下焦虛冷赤白帶下五色月水淋漓不盡

坐藥龍鹽膏

治帶下

勝陰丹

治前方

回陽丹



如聖丹

治經脈不調赤白帶下

治帶下滑脫

側柏地榆湯

治赤白帶下不能成孕

白芷散

治赤白帶下

伏龍肝散

治赤白帶久不產胎

馬蹄丸

治白帶不絕

固真丸

治白帶大下不止

一方

治赤白帶下不問遠年近日

茅花散

治血崩不止赤白帶下

雙白丸

治白帶如神

白附丸

治經年崩漏不止諸藥不效脉濡微

地榆膏

治赤白帶下骨立者

治白濁白淫

加味四七湯

治婦女小便不順陰戶疼痛

鎖精丸

治白濁白帶淋漓

固精丸

治下虛胞寒白濁如泄如疑脂或小便無度腰重

內金鹿茸丸

治勞傷血脉胞絡受寒小便白濁日夜無度

金鎖正元丹

治此氣不足吸吸短氣四肢酸軟目暗耳鳴遺精盜汗白濁

威喜丸

治丈夫陽虛精氣不固餘瀝便溺夢泄婦人白帶白濁白淫下部常溫



烏金散

治身熱口燥氣喘築痛下黃水如葵汁

一方

治虛寒白濁滑數不禁

卷之四

虛勞

論婦女虛勞與男子不同

論初病大法

論無熱虛勞

論有熱虛勞

論瘵骨蒸熱

論血風勞

治虛勞不補諸方

增損四物湯

治氣血不足四肢怠痛少氣及產後下血過多榮衛虛損仁寒仁熱

六神湯

治脾氣不和榮衛不足怠痛困倦不嗜飲食

聖愈湯

治血虛心煩睡臥不寧

加減大建中湯

治胎產虛損月水不調腹痛寒熱自汗口乾

當歸建中湯

治一切血氣虛損

雙和散

治大病後虛勞乏力

八珍湯

治氣血兩虛

補中益氣湯

治形神勞倦飯食失節脾氣虛損下臨以致發熱頭痛心煩瘦弱



補中益氣湯 治氣虛 補中益氣湯 治氣虛

歸脾湯 治脾經失血少寐建忘驚悸發熱盜汗不思飲食 黃耆散 治食後身倦盜汗

桔梗引子 治心氣不足 補肺湯 治勞嗽補熱盜汗自汗

劫勞散 治心腎俱虛嗽聲無痰夜熱盜汗倦 人參丸 養陰生血補虛

補中丸 治婦人虛損諸疾

七補丸 治血氣虛弱腹中經結狀若懷孕月候尚來

十補丸 治諸虛百損形瘦面黃寒熱口苦血崩帶下墮胎孕婦尤宜 羊乳丸 治虛勞羸瘦

茲陰百補丸 治勞傷血氣陰陽不和三寒在熱心腹疼痛不思飲食

六味丸 治腎經不足熱渴便閉痰嗽眩暈耳聾咽燥腰腿痠軟盜汗便血諸血天音

八味丸 治命門火衰不能生土脾胃虛弱便瀉腹痛疼痛泄瀉等証

益陰腎氣丸 治腎水不足潮熱盜汗煩熱食少咳嗽胸痞便赤足熱

烏雞煎丸 治氣血虛勞赤白帶下 人參驚甲丸 治一切虛損咳嗽盜汗寒熱不思食

艾煎丸 治婦人諸虛 著味丸 補虛散



治無熱虛勞

附子理中湯

治氣陽不足飲食難化便泄腸鳴手足逆冷

黃耆建中湯

治諸虛不足補益榮衛

加味黃耆湯

治陽虛惡寒

十全大補湯

治冷

渾身碎痛引子

治勞倦

木香丸

治冷勞經脈不調臍腹氣滯四肢疼痛食無味

戊巳丸

治新舊男婦素稟虛寒滑泄喫食嘔吐狀如翻胃

硃砂丸

治冷勞積聚腹脇疼痛肢瘦不食

治有熱虛勞

逍遙散

治血虛煩熱肢瘦胃弱飲食減臥月水不調漸成骨蒸

黃耆散

治勞熱四肢煩疼躁渴煩瘦不欲食

子芩散

除涼心肺勞熱

知母散

治癰瘦壯熱四肢煩疼咽喉不利不思飲食

半夏散

治熱勞煩渴口乾寒熱痰道嘔吐不欲飲食

秦芫散

治經血有熱月脉凝滯五心煩倦

鱉甲地黃湯

治手足煩熱怔忡悸悶及血室有乾血

胡黃連散

治經脈不通四肢疼痛煩也失眠飲食全少

犀角散

治心胸煩熱經脈澀滯

紅藍花散

治經脈不通

鱉甲散

治勞熱發渴壯熱四肢煩疼漸漸黃瘦心胸燥悶



阿膠丸 治勞嗽出血發熱口湯盜汗

猪肚丸 治熱勞

治骨蒸勞瘵

加味四物湯 治骨蒸

黃連散 治骨蒸勞熱四肢昏沉背疼面黃無力

青蒿散 治骨蒸

柴胡散 治骨蒸勞熱妨悶不欲食

河車丸 治勞嗽一切方瘵虛損骨蒸等

黃芩丸 治骨蒸勞熱不眠

地黃煎丸 解勞生肌活血養心

治傳尸勞

天靈蓋散 治傳尸骨蒸四肢無力至晚發熱煩紅煩躁

益母草丸 治骨蒸月候不連

獺肝丸 治骨蒸煩疼不欲食

殺鬼方 治傳尸勞瘵鬼氣伏連

治血風勞方

人參荊芥散 治血風發熱体疼頭昏寒熱盜汗痰嗽

地骨皮 治血風体弱寒熱發渴

大效油煎散 治血風勞氣攻注四肢疼痛嘔逆醋心痠黃麻痺血海冷敗



萬金退還散

治血風勞煩躁怔  
神憂悞頭重盜汗

熟乾地黃丸

治冷無攻心小腹  
疼痛食少羸瘦

卷之五

積聚癥瘕

論婦人諸積形狀

瘕瘕疝瘕入  
瘕瘕食瘀血

論八瘕所

黃青燥血  
脂狐蛇

論癥瘕

論食癥

論血癥

論腹中瘀血

論瘕瘕

瘕近臍左右一條筋急  
瘕在兩肋時痛

論疝瘕

案有

論腸覃

乃寒客大腸覃延日久始如卵久如胎  
按之堅推之移月事時不氣病血不病

論婦人瘕瘕並屬血病

垂瘕  
米瘕

酒瘕

論治積須養正氣案有

論痰積用吐下案有

脉法

通治諸積方

開鬱正元散

治痰飲血氣鬱結食  
氣不升降脹痛

助氣丸

治三焦痞閉胸膈滿悶氣  
結成積瘕瘕氣塊並治

大七氣湯

治積聚隨氣上下心腹疼痛上

勝紅丸

治脾積氣滿滿悶氣促嘔吐清水酒積血積食積

三稜煎

治婦人血瘕

香稜丸

治一切積痰癰塊

大硝石丸

治七瘕入瘕帶下絕產此藥去瘕瘕令人不困

阿魏膏

治一切瘰癧

分治八瘕方

皂莢散

治黃瘕

瘕毒瘕

坐導

瘕燥瘕

瘕血瘕攻刺腹脇時痛

瘕血瘕瘕方

桃仁煎

治血瘕血積經候不通下如豆汗如雞肝蝦蟆衣狀有本事方宜

瘕脂瘕方

皆男于陰頭

導散方

內陰中

瘕狐瘕方

服

瘕蛇瘕方

服

瘕鼈瘕方

服

治瘕瘕方



穿山甲散

治婦人廠痞惡血攻心腹

蓬莪散

治

丁香丸

治癥瘕結塊不散心腹疼痛

桃仁散

治癥瘕痞心腹脹滿不食無力

治食癥方

化積丸

治婦人死血食積痰飲塊在兩脇動作雷鳴維眩暈寒熱時作時止

小三稜煎

治食癥酒癖血瘀氣塊時發刺痛不思食一切積滯不消

礞石丸

治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

礞石丸

治食痰火不消攻刺心腹疼痛

治血癥方

增味四物湯

治婦人血積遇寒觸痛不可忍

六合湯

治經事不行腹中結塊腰腿重痛

血竭散

治血瘀作痛脇下脹滿月經不行發熱體倦

牡丹散

治久虛血塊未注心腹疼痛

當歸丸

治月經不調血積證

大黃散

治血癥血瘀食積痰滯

大紅花丸

治血積癥瘕經絡滯滯

治腹中瘀血方

桃奴散

治血熱瘀血停積經水不調男子跌撲傷損皆效

大黃湯

治血瘀不消及打撲傷損

琥珀散

治經緯痞塞瘀血痛不可忍

地榆散

治敗血

治瘕癖方

麝香丸

治痰癖冷氣症氣心腹痛不可忍

治婦人瘕癖氣血等神效

用漬猪肝

葵白散

治冷氣不和膀胱氣攻痛胎產腹痛血臟冷百節痛婦人一切疾病

烏鵲煎丸

治胎前產後諸疾及脚膝浮腫並治有十八引有醫案

四等丸

治瘕癖心腹疼痛飲食不消

又方

龍甲大黃三棱

木香礪砂丸

治瘕癖血塊刺痛脾寒猪食不消久不瘕

治瘕瘕方

乾漆散

治瘕瘕久不消令人黃瘦兩脇妨悶心腹疼痛

當歸散

治瘕瘕攻刺心腹痛不可忍

榴砂丸

治瘕瘕瘀血在臟時攻腹脇疼痛

巴豆丸

治瘕瘕血氣疼痛

黑神丸

治腎氣膀胱疝瘕疝墜五膈血崩產後諸血漏下赤白死胎難產

痛露丸

治傷寒於內氣凝不流結於腸外久為瘕瘕時作疼痛腰不得伸各賜單



烏喙丸

治陽事亦治乳餘并男子疝氣

見龍丸

治寒客下焦血閉成痼日以盜大狀如懷子名曰石痕

蓮膏丸

治疳積肌肉消瘦發熱潮熱食少口乾或肝疳口鼻生瘡牙齦腫爛等症

卷之六

求子

論求子須知先天之氣

論求子脈須平和

論求子先調經

論求子貴養精血

論求子必知綢繆之時

論合男女必當其年

論男女精血盛衰

論成胎分男女之異

論男女各由百脉齊到

趕經法

逐月養胎法

論癸飲不孕

論求子禁用熱藥

論孕子雜法

脈法

治血虛不孕方

加味四物湯久服有子

加味四物湯治血氣兩虛不孕

調經種子湯治七情所傷致血衰氣盛經水不調或滯或紫或崩帶疼痛令

經驗育胎丸治久無子嗣服此經婦人歸附丸不但種子且無小產產後諸症

神仙附益丸不唯治婦人自病而生育之功如神 加味地黃丸治久無子育效如影響

金蓮種子仙方女入服之有孕

百子建中湯調經養血安胎順氣不問胎產月事參差悉宜 加味養榮丸服之有孕且無小產之患

加味香附丸女入服服聚精丸 大五補丸治瘦人無孕乃無血耗精故宜潤

增損三才丸

神效墨附丸治久無子而經事不調及數墜胎者可立效 育萬鳥鴉丸服之能令多子

天烏鴉丸治血虛有熱癆瘦經不調骨蒸消帶不能成胎 小烏鴉丸治婦人百病有二十六引

十全濟陰丸養陰抑陽妙在河車因人加減初無定法計十二條



治宮冷不孕方

調生丸

一名誥

治衝任虛寒胎孕不成或而多墮

調氣暖宮丸

勝金丸

即女金丹

治產後失調經渾帶下腰重寒熱身發或暈嘔逆一切雜症

白薇丸

治月水不利四肢羸瘦漸虛乏

白薇丸

治無子斷經上熱下冷

秦桂丸

治血海久冷不能孕育

艾附丸

後各隨飲下

王子丸

此藥服之不過一月有孕試效

溫胞湯

治婦人全不產育及二三十年不孕者

南嶽魏夫人濟陰丹

治血海虛冷久無孕育及數墮胎一切不調崩漏

紫石英丸

治子宮久冷不孕及數墮胎月候不勻崩漏微瘕白淫白帶

坐蓮藥

治婦人全不產及隨續服前

內藥續生丸

同前

治痰塞不孕方

丹溪種芝湯

治婦人肥盛無子以脂膜閉塞子宮也宜服此

丹溪度芝丸

治同前

金斯丸

治風

消脂膜痰湯

一方治肥盛婦人稟厚恣酒食經不調胎滿溢不能成胎

治婢妾不孕方附治婦人妬嫉方

煮附丸治婢妾多鬱情不宜暢經多不調故難成孕此方最妙

一方治婦人妬妄誤夫無子常服不妬

附斷子方

計四方二論

卷之七

浮腫

論浮腫由血水分證治不同

治方

椒仁丸治先因經斷後至浮腫小便不利血化為水名曰血分

葶蘆丸治先因小便不利後至身面浮腫名水分

人參丸一名亭治經脈不利血化為水相類

小調經散治敗血停積日久腐化成水變為浮腫已利水藥產後浮腫亦宜

桑白皮散治脚氣感發兩足浮腫小便赤澀腹脹氣急坐臥不得



正腕散 治中焦虛痞兩脇氣痛而口手足浮腫大便閉結兼治脚氣

大調經散 治寒發熱自汗浮腫 大腹皮散 治婦人血壅

大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如敦敦狀小便微澀不渴產後水血併結血室

前陰諸疾論

論陰戶腫痛

論陰痒生蟲

論陰戶生瘡 附陰痔併茄子疾

論陰挺下脫

論陰冷

論交接出血作痛

論傷丈夫頭痛

脈法

治陰戶腫痛方

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩脇腫攢作痛小便澀陰挺如茵或出如蟲等症

加味四物湯 治陰戶腫痛

九味柴胡湯 治肝結核凡肝膽瘡瘍瘰癧

加味小柴胡湯 治肝經腫脹小便不利寒熱往來胸熱胸脇作痛

加味逍遙散治婦人肝脾血虛濕熱下注 菖蒲散治陰戶腫痛

麻黃湯洗方治陰腫 經心錄方治陰中腫

白礬散治陰腫 黑白散治陰中

枳橘炭治陰腫如石痛不利 雜方計四 治陰中腫痛

治陰痒生蟲方

大黃散治陰痒

硫鯉丸治陰中蟲亦

廣濟方治陰痒不止

一方治陰中生細蟲痒不可忍若食臟即死

又方治同上

聖惠方治陰中蟲痒痛目腫身黃欲得 崔氏療陰痒不可忍方

又三方

治陰戶生瘡方

補心湯治陰戶瘡名蠹瘡或痛痒如蟲行濃水淋濕陰蝕已盡並治 養心湯治陽明虛不榮



一方 治陰瘡膿水淋漓痒痛

治陰瘡方

治疳瘡 因月後行房致成淋濁伏流陰道疳生搔痒無時

雄黃散

又方

銅綠散 治男婦陰部濕淹瘡

柏油散 治下疳濕瘡

治陰痔方

治陰中生痔九竅有肉突出者名爲痔

洗方 治疳子疾

又方 治同上

治陰挺下脫方

楊梅瘡 治陰瘡痛痒膿水淋瀝

治陰瘡與男子妬精瘡大同小異方

黃芩湯 治陰中瘡

當歸湯 治陰蝕

則後方 治陰瘡痒痛

麝香杏仁散 治陰瘡

又方

傳藥

婦人陰中突出一物長  
五六寸名陰挺又一名  
又方同治

三葉丸  
治陰中一物牽引腰腹膨脹痛甚不思食因服熱藥煎烤或非理房事

一稔金丸  
服前藥未效服此又附一方妙  
治陰挺下脫方

又方  
計西  
華莖法

托藥  
摻藥

敷藥

治陰冷方

五加皮浸酒方  
治婦人癖瘦陰冷

八味丸  
治血弱不能榮養臟腑津液枯治陰冷  
治陰冷方

又三方  
溫中坐藥方

治交接出血作痛方

千金方  
治女入交  
又五方



小兒癰疽方

又三方

治傷丈夫頭痛方

附脚指  
縫裏方

集驗方

療婦人傷丈夫四  
肢沉重吐吸頭痛

桑白皮湯

治傷丈夫若  
頭痛欲嘔悶

金蓮穩步

治婦人脚  
抽經壞痛

卷之八

胎前門

論胎前十二經所養

論治胎產三禁

論胎前調理法

論胎前用藥法

孕婦食忌

孕婦藥忌

孕婦起居忌

候胎法

診婦人有娠歌

驗胎方

神方驗胎散婦人兩三個月月

驗胎方已經三月

艾葉湯過月難明或月

探胎散

逐月養胎法

烏雞湯一二月寒多為胎熱多卒驚服重

補血湯一二月胎

艾葉湯一二月胎

黃連湯二三月

艾葉湯三四月胎

茯苓湯三四月

艾葉湯四五月胎

調中湯四五月

艾葉湯五六月胎

安中湯五六月

艾葉湯六七月胎

柴胡湯六七月

艾葉湯七八月胎

杏仁湯七八月

艾葉湯八九月胎

葵子湯八九月

艾葉湯九十月胎



諸腎湯曾傷九月胎者宜預服

惡阻

半夏茯苓湯治惡阻嘔吐心煩眩暈惡食好酸多臥有痰胎孕不寧

陳皮半夏湯治氣血不足惡阻嘔吐不食

縮砂二陳湯治婦人嘔吐飲食不化脾胃虛弱

青竹如湯治惡阻嘔吐不食

一方治婦人惡食心煩嘔吐

茯苓丸治婦人嘔吐心煩

橘皮湯治惡阻不食

人參丁香散治惡阻胃寒吐逆

白米散治氣不

縮砂散治嘔吐不食

旋覆花湯治難六七月嘔吐不安惡阻

參橘散治婦人嘔吐飲食不化心煩

蘆根湯治惡阻嘔吐痰水

人參半夏丸治惡阻嘔吐不食

歸脾散治惡阻嘔吐頭痛

白米湯治胃虛惡阻吐水

二香散治胎不安氣不

保生湯治嘔吐酸水

胎動不安

安胎散

治胎常服安胎

芩朮湯

常服健脾胃清熱安胎

金匱黃芩散

養血清熱孕婦常宜懷人血少

釣藤湯

治胎八九月胎動腹痛面赤

十聖散

治因母疾氣衰血少不能護胎者宜服

黃芩湯

治胎動腹痛下黃汗

佛手散

治胎因氣鬱胎動不安或死腹中惡露不下疼痛不已

小膠艾湯

治傷損動胎下血腹痛

膠艾湯

治胎二三月至八九月胎動不安或死腹中惡露不下疼痛不已

阿膠散

治胎不安或因腹痛有所下者

當歸湯

治胎動不安或因腹痛有所下者

一方

治胎從高墜下腹中下血煩悶

三物解毒湯

治誤服毒藥動胎

白扁豆散

治誤服毒物

胎漏下血

附經來

加減膠艾湯

治胎動漏血

安胎飲

治胎卒然腰痛下血不已



大金丹

治妊娠三四月腹痛時時下血

如聖湯

治胎動腹痛

安胎當歸湯

治胎舉動驚悸胎不安小腹痛引腰絡下血

枳殼湯

治胎

當歸寄生湯

治胎漏非時下血

二黃散

治胎

阿膠散

治無故卒然下血

一方

治胎漏不止胞乾即死

榆白皮散

治胎漏難產

一方

治胎漏暴下血數升胎燥不安

子芩散

治肝熱下血妄行

防風丸

治肝風血散不歸

防風黃芩丸

治肝經風熱致血崩便血尿血

本事方

治胎漏不止

桂枝茯苓丸

治宿藏經斷三月漏下不止臍上痛者後月經也

大金丹

治胎忽下黃汁如豆汁等物胎動不安

銀學酒

治胎下黃汁或亦豆汁

煩躁

即子煩口

竹葉湯

治妊娠心驚胆怯終日煩悶

知母飲

治心脾熱咽膈苦煩悶多驚

犀角散

治子煩

當歸散

治胎

人參散治熱乘心脾津液

竹茹湯治煩躁

治婦人煩熱不止

一母丸治因服藥胎不安似虛煩不得眠謂之子煩作虛煩治損胎氣

心腹脹滿即了

紫蘇飲治胎氣奏上心腹脹滿疼痛謂之

有案

訶梨勒散治胎人心中腹脹滿氣衝胸膈

保胎和氣飲治胎前四五個月不思飲食

瘦胎飲治胎前五六個月胎氣困弱

葱白湯治胎前上通心煩

倉公下氣湯治心腹兩脇脹悶欲死

大聖散治婦人怔忡睡中多驚

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食



安胎和氣飲

治胎冷腸痛引兩脇  
小便頻數大便虛滑

仲景附子湯

治六七月胎動不安  
惡寒小腹如扇子臍寒也

心痛論

火龍散

治妊婦心痛

產寶丸

治妊婦心痛欲死

白朮湯

治妊婦心痛欲死

千金方

治妊婦心痛

一方

治妊婦心痛絕欲死

一方

雜方

道三

補遺五方

沉香降氣湯  
紫蘇飲

單延胡索飲  
茯苓補心湯

四七湯

心腹痛論方

川芎散

治妊婦素有冷氣  
心腹疼痛如刺

阿膠散

治妊婦胎動  
腹痛不思食

當歸芍藥散

治妊婦腹中  
去血過多胎虛乏

一方

治妊婦腹痛  
胎動不安

香薷散治腹五月胸膈悶氣刺痛滿腸鳴

有案

古今錄驗方治妊娘腹內冷痛胎動

又一方治胎動欲落腹痛不可忍

一方治妊娘腹痛

一方治妊娘四五月忽然疴痛

腹痛論方

地黃當歸湯治胎

加味四物湯治血少

小腹痛論方

療妊娘被驚惱胎向下不安小腹連腰痛下血

補遺湯治小腹痛胎動不安

腰腹及背痛論方

通氣散治妊娘腹痛不再忍神效

五加皮散治妊娘腰痛不可忍

五加皮丸治妊腰

療觸動胎以致腰痛背痛

療妊娘氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛



小晶萃根方 治損胎腰腹痛去血胎向下

紫酒 治妊娠腰痛如折亦治常入卒腰痛

胎水腫滿論方 即子腫子滿子氣

白朮散 治妊娠面口虛浮四肢腫如水氣

葶藶散 治妊娠身洪腫

一方

澤瀉散 治遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀

天仙散 治妊娠成胎之後兩足面漸腫至腰膝行步艱難喘問妨食狀似水氣

崔氏方 治體腫水氣心腹急滿

子和方 治脚土至腹腫小便不利微渴

腹中鐘鳴方

產寶方 治小兒在腹中哭及孕婦腹內鐘鳴

大地黃丸 治產前後腰腹痛一切血

雜方 俱妙

木通散 治妊娠身重浮腫四肢腫急小便不利

千金鯉魚湯 治妊娠身浮腫小便赤澀

防己湯 治妊娠身浮腫小便不利

產寶方 治外感身腫水氣心腹脹小便數

腎脊湯 治妊娠腰脚腫

補遺方 治腹內見哭

一法論有

積聚論問出素

丹溪方治血塊如盤有孕難服咳劑者此方

卷之九

胎前門

傷食

平胃散治妊娠飲食停滯或吐腹作痛

木香丸治妊娠脾胃虛食不消膨脹吐瀉

中惡

當歸散治妊娠中惡心腹疼痛

散滯湯治觸惡氣傷胎肚痛手不可近不思食

又方計二首

六君子湯治脾胃虛弱飲食難化腹滿泄瀉

白朮散治妊娠脾胃氣不和飲食易腐

又方計首

補遺方治妊娠中惡心腹絞痛如鬼繫不可按或吐衄血者



傷寒

白朮散治傷寒熱病先以此安胎但覺頭疼發熱者可服四肢厥冷陰症也不可服

安胎阿膠散治妊娠傷寒時氣先以此安胎却以主藥問脈

香蘇散凡妊娠傷寒勿論日數但見惡寒頭痛以此主之羌活湯解利傷寒不問何經所受妊娠尤宜

黃龍湯治妊娠傷寒邪在半表半裏者

三黃解毒湯治妊娠傷寒表邪悉罷煩躁大渴六脈沉實此主之黃耆解肌湯治妊娠傷風白汗

桂枝芍藥當歸湯治妊娠傷寒腹痛頭重腹中切痛芍藥湯治妊娠傷寒白利腹中痛飲食不下

加減當歸六黃湯治妊娠傷寒發汗不止胎氣損者

加味黃芩湯治妊娠傷寒下後胎氣損加味竹葉湯治妊娠傷寒下後虛熱不除

黃龍四物湯治妊娠傷寒後發熱加減四物湯治妊娠傷寒發熱如錦文

梔子大青湯治妊娠傷寒發熱為黑色一方治妊娠傷寒發熱如血胎欲落

護胎法治傷寒熱護胎法治孕婦一切有熱諸症

中風

防風散

治妊婦中風悶亂口禁因肢強急

防已散

治妊婦中風口眼喎斜手足頑痺

赤箭丸

治妊婦中風手足不隨筋脉緩急言蹇不仁

醋艾熨法

治妊婦因外感風如中風狀不省人事

風痙

即子痙

羚羊角散

治妊婦胃悶角弓反張

芎活湯

治子癰逐產後惡血下胞

瘈瘲

鈎藤湯

方見胎動不安

子瘖

大全論

生犀角散

治妊婦卒中風不語強直悶亂昏潰

曰僵蠶散

治妊婦中風口禁心隔痰壅不語強直

白朮酒

治妊婦中風口

葛根湯

治妊婦臨月發風痙悶憤吐道少醒復發

羌活酒

治妊婦中風痙日

黃帝問



欬嗽

桔梗散

治妊娠肺壅咳喘急不食

馬兜鈴散

治妊娠胎氣壅塞咳嗽氣喘

百合散

治妊娠風壅咳喘痰多喘滿

紫芫湯

治妊娠咳嗽不止胎動不安

喘急

平安散

治妊娠上氣喘急大不通嘔吐不食腹脇脹痛

桔梗湯

馬兜鈴散

二方見前

吐血衄血咳唾血

河間生地黃散

治諸見血

局方必勝散

治男婦諸血妄流

瘧疾

七寶散

治男婦切瘧疾

人參養胃湯

治妊娠瘧疾寒多熱少頭暈

清脾飲

治妊娠瘧疾熱多寒少口乾便秘脈弦數

驅邪散

治妊娠停食

柴胡散

治妊娠瘧疾

又方 治痢疾

霍亂

香蘇散加藿香方

治妊娠霍亂

回生散

治中氣不和霍亂吐瀉

七味白朮散

治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

理中湯

治妊娠霍亂復痛四肢逆冷汗出脈虛

人參散

治妊娠霍亂吐瀉心煩復痛飲食不入

白朮散

治妊娠霍亂腹痛吐利不止

木瓜煎

治妊娠霍亂吐瀉轉筋悶絕

竹茹湯

治霍亂

益元散

桂冬甘露飲

冬葵子湯

並治霍亂

泄瀉

胃苓湯

治脾濕太過胃氣不和腹痛泄瀉

不換金正氣散

治施見傷

胃風湯

治風冷乘虛入客灰色米泔化泄瀉注下濕毒豆汁瘀血等

一加味理中湯

治妊娠泄瀉

加味治中湯

治飲食過多脾胃之氣不能運化而瀉

錢氏益黃散

治妊娠泄瀉嘔腹情手足冷



草果散

治臟腑虛寒  
腹痛泄瀉

痢疾

白朮湯

一名三  
物湯

治孕  
痢膿血

黃連湯

治妊婦下痢赤  
白膿血不止

三黃熱艾湯

治妊婦下痢  
熱下痢

大寧散

治妊婦下痢赤白  
灰色泄瀉痛重

鴨蛋湯

治胎前產  
後赤白痢

大小便不通

大腹皮散

治妊婦大  
小便不通

當歸散

治妊婦因怒肚腹脹痛四肢腫  
喘急大便難小更難產門腫

一方

治妊婦風氣  
大便秘澀

又方

治大小  
便秘

當歸芍藥湯

治妊婦腹中  
疼痛赤白

蒙黃黃連湯

治妊婦下痢赤白  
道腫痛冷熱皆可

歸著湯

治妊婦下痢  
痛小便澀滯

厚朴散

治妊婦下痢  
黃水不絕

二黃散

治妊婦下痢赤  
白絞刺疼痛

葵子湯

治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除熱

又方

猪苓散

治妊娠小便澀痛兼治胎水

甘遂散

治妊娠子淋大小便並不利氣急

小便不通

冬葵子散

治妊娠轉胞小便不通男子皆效

全生茯苓散

治妊娠小便不通

葵榆湯

治妊娠小便不通臍下妨悶煩亂

獨聖散

治妊娠小便不通

歸母苦參丸

治妊娠小便難飲食如故

雜方

治妊娠小便不得小便

子淋

五淋皮

治孕婦熱結膀胱小便淋瀝

子淋散

治妊娠小便澀痛頻數

安榮散

治妊娠小便澀少遂成淋瀝

加味木通湯

治妊婦喜食炙博作痛熱致小便赤澀

生津湯

治妊婦常病自汗下痢後小便短少不痛

大腹皮散

治妊婦八九月胎形肥碩小便短少小腹脹

冬葵子湯

治妊婦小便赤澀而痛此胎熱也

地膚子湯

治孕婦小便澀痛

地膚大黃湯

治妊婦子淋宜下



一方 療妊娠數月小便淋瀝疼痛

補遺方 治胎前諸淋小便不通

雜方 治妊娠子淋

遺尿

白薇散 治妊娠尿

一方

桑螵蛸散 治妊娠小便不禁

一方 並治妊婦遺尿

尿血

續斷湯 治妊娠下血及尿血

薑蜜湯 治妊娠小便尿血

雜方 計六方

一方 治妊娠尿血

加減五苓散

眼目

天門冬飲子 治妊娠肝經風熱上攻眼目吊失明

忘憂散 治妊娠心經蘊熱小便赤澀淋瀝

一方 治子淋及子煩

天門冬飲子治婦人肝經氣熱上  
臟燥悲傷

甘麥大棗湯治婦人臟燥悲傷不止

膽竹茹湯治妊婦心虛驚悸

又方治胎臟燥自笑自哭

妊病下胎

桂心散治妊娠因病胎不能安可下之

一方

千金神造湯治雙軀少陰脈微陰死此方主之  
下胎方能安可下之

又方計五首

防胎自墮

芎藭補中湯治血氣虛弱不能養胎數月而墮

阿膠湯治數墮胎小腹疼痛不可忍

千金保胎丸治婦人受孕經三月而胎墮者

杜仲丸治妊娠三兩個月胎動不安

刪繁方治妊娠懷胎數月落而不結實

胎墮後為坐產



人參湯

治半產血下過多心驚目

人參黃耆湯

治小產氣虛

龍骨散

治血不止

全生活血湯

治婦人分晚或半

生地黃湯

治雄娠胎氣損墮後

當歸酒

治墮胎後

烏金散

治墮胎後

紅藍花散

治墮胎後血不出

白蜜湯

治墮胎後

當歸湯

地黃湯

澤蘭湯

蒲黃酒

已上四方治

當歸川芎湯

治小產後瘀血

芎藭湯

治墮胎心

當歸散

治產後氣血虛弱惡

當歸補血湯

治燥熱目赤面

四物二連湯

治血虛

胎不長

安胎白朮散

治妊娠風有

黃耆湯

治胎不長

長胎白朮丸

治孕婦風有

人參丸

治胎不長

大其氣虛通胎之不通

鬼子托治胎前月不

先期欲產過期不產

知母丸

治妊娠日月未足痛欲產

槐子丸

治妊娠月不足而似欲產

又方

計三首

加味四物湯

治過月不產用此補血行滯

鬼胎

斬鬼丹

治鬼胎如抱一癰

斑玄丸

治鬼胎或於妖魅

雄黃丸

治鬼胎癰血腹痛

枳實積榔丸

治妊娠癰瘕痞塊

卷之十

臨產門

論臨產調理法

臨產催生法

論難產由於安佚氣滯

論難產由於氣虛不運

論難產由於血滯血乾

論十產

楊子建

產難治驗

論交骨不開



論胎死腹中

臨產脈法

臨月東胎方

束胎丸 東胎易生

達生散 孕至八九月服之易產

又方 第九個月服

滑胎枳殼散 孕至八九月服之易產

內補丸 治妊娠衝任脉虛補血安胎

張氏方 治胎肥壅隘臨月服之東胎易產

保生無憂散 治妊娠安逸甘肥不節致胎肥難產或血少胎弱八月服之易生

神寢丸 易產

難產催生方

三合濟生湯 治產難不下服此即生

佛手散 即芍藥湯治因事子死露露安行腹痛服此探之若死即下痛減子母俱全

來甦散 治臨產用力太過脉微神倦致頭暈此喉面青髮直不省人事

黑神散 一名催生如神散治橫生逆產及胎前產後崩漏不止

榆日凌散 治妊娠易生

如聖散 治難產

七聖散 一名七聖散治難產

臨產脈

催生散 治產難并胎衣不下

催生散 治臨產生育難

催生湯 候產母腹痛腰痛見胞漿下方服

七聖散 一名七寶散 臨產腰痛可服

活承無憂散 治因恣情多契熱毒之病胎血

烏金丸

一方 治宿有病產難累日不下氣力乏盡

勝金散 治產難由於見枕破破血裏子故難產服此逐其敗血

一方 治橫逆先露手足

油蜜煎 治產難胞漿乾不得下

五腦丸 各催治產難及橫生逆產

柞木飲子 治產難橫逆成胎

催生如聖散 治胎漏血乾難產痛極

催生如意散 治橫生倒產

催生鉛丹 治橫逆難產

三退散 治橫逆難產下死腹中

滑產散 治生神効

一方 治產不順

一方 治橫逆難產

神妙乳砂丹 治諸難產

又方 治難產

如神散 治生驗

小品方 治橫生倒產手足先出

一方 治橫逆難產手足先出



黃金散

治生產一二日難分娩者

勝金丹

治難產神妙

催生萬金不傳遇仙丹

治難產以此丸吊東臍中

如聖丹

治產難并胞衣不下死胎

一方

一方

並治產難下胎

立聖丹

治產難橫逆惡候死胎不下

雜方

治產難

計二十首

治交骨不開

龜殼散

治交骨不開不能生產

治胎死腹中

烏金散

治一切產難死胎

香桂散

治下死胎

平胃散

治死胎不下指甲青古中脹悶口中作尿臭

一方

治產難三五個月胎死不出

千金神造湯

治動胎難產子死腹中及雙胎一死一生服之令死出生安

一方

治胎死腹中乾燥看皆

一方

治子死半產或半着脊及胞水早乾胎澁不下

一方

治胎死腹中或牛產不下

半夏湯

治胎衣不下子死腹中或血衝昏悶或血暴下胸乾不能產

下胎丸 治難產胞衣不出橫痃及鬼死腹中母氣欲絕

一方 治胎死腹中胞衣不下臨產危急妙

靈應奪命丹 治臨產驚然氣痰目翻口禁

宜明砂散 治胎死不下

牛膝丸 治下死胎

一方 治產難數日死

如聖膏 治難產及死胎下胞衣

一字神散 治子死腹中胞大不干

雜方 治死胎計二十三首

卷之十一

產後門

論產後調理法

論產後大補氣血為主

論產後服藥之誤

論新產三病

產後諸忌

脉法

胞衣不下

奪命丹 治胸衣不下由胞為此所脹

奪命丸 治胞衣不下并死胎



牛膝湯

治胞衣不出臍腹堅

牛膝散

治胞衣不出腹中脹痛

加桂芍歸湯

治產母元氣虛胎

黑龍丹

治產後血暈一切危急死者

花蓋石散

治產後敗血不盡血暈胎死胞衣

一方

治胞衣

千金備急丸

治產後惡血衝

胡氏方

治胞衣

雜方

治胞衣不下計十九首

血暈

逆附厥

清血散

治產後氣血虛血暈隨氣

芍藥湯

治產後去血過

保命集方

治產後血

附註

治產後血暈

獨行散

治產後血暈

奪命散

治產後血暈八

四味散

治產後一

黑神散

治產後胎衣不下

紅花散

治產後血暈血崩

鹿角散

治產後血暈山

鬱金散

治產後血上衝

治血

治血

牡丹散治產後血暈

應書一方治產後心煩口渴頭硬者

荆芥散治產後風虛血暈精神昏昧

一方

一方

一方俱治血暈

余公治產後血厥而胃

白薇湯治產後胃弱多汗亡血發厥

惡露不下

起枕散治惡血不行心腹及兒枕痛

荷葉散治惡露不下疼痛煩悶

通瘀飲治惡露不通昏沉寒熱

廣濟方治惡露不下

保命集方治惡血

沒藥丸治惡露方行忽止驟爾寒熱臍腹百脉皆痛

黑龍丹治胞衣不下

治惡血不下雜方計三首

血露不絕

論血露不絕

芎歸加芍藥湯治血崩

加味四物湯治崩如豆汁紫色過多

一方治產後七八日惡露不止



加味四物湯

治產後月餘經血淋瀝

烏金散

治敗血為暈及淋瀝崩中

豆淋酒

治產後餘血水氣

一方

治同上

牡蠣散

治惡露淋瀝煩熱瘵瘦

血崩不止

論血崩不止

加味四物湯

治崩如豆汁紫色過多者二方見惡露不絕

乾熟地黃散

治崩中旋暈神昏煩亂

瑞蓮散

治崩漏如湧泉

千金方

治崩中下血

千金方

治惡血不盡或經歲月

一方

治惡血崩漏不絕

蒲黃飲子

治新產逐瘀生新

一方

治產後世血無度

芎歸加芍藥湯

治血崩眩暈

荷效四物湯

治血崩素行熱者方見血崩

阿膠丸

治崩中下血虛羸

固經丸

治血氣未復房事及勞役致血暴崩

心痛

大崩湯

一名桂心湯

治素有宿寒因寒

失笑散

治惡血上攻

黃金散

治惡血上衝心腹作痛或發熱作渴

火龍散

治氣滯心痛

伏龍肝散

治惡物不出上攻心痛

一方

治惡血衝心痛悶欲絕

一方

治產後血不盡心腹痛

腹痛

並小腹痛

加味四物湯

治惡露不盡腹痛

海藏方

治敗血作痛

一方

一方

俱治敗血作痛

當歸蒲

治產後血瘀及臍下脹滿作痛

延胡索散

治惡血攻刺不論新久

延胡散

治見枕腹痛

烏金散

治敗血走刺心腹見枕痛

地黃散

治惡血不盡腹中痛

四神散

治瘀血不消成塊心腹切痛

黑神散

治產後血塊痛

丹溪散

治血塊痛發熱

卷荷散

治惡血衝心血刺



荷葉散

治惡露不下腹中疼痛煩悶

又方

治下血不盡腹內堅痛不可忍

產寶湯

治餘血作塊

香桂散

治下血不盡

當歸養血丸

治惡露不散發渴心腹疼痛連及腰痛

玉燭散

治惡露凝結

下瘀血湯

治腹中結塊

千金桃仁丸

治產後瘀血腹痛

獨聖散

治血虛腹痛

定痛散

治產後惡露不止

當歸建中湯

治產後虛弱腹中刺痛引腰背不能食

千人方

治產後惡露不止

隱若澤蘭湯

治惡露腹痛

又方

治惡露結聚

延胡索

治腹痛

當歸血

治腹痛

紫金丸

治腹痛

枳實芍藥散

治腹痛

保命方

治血暈

增損四物湯

治產後陰陽不和

當歸散

治產後血虛腹痛

羊肉湯

治產後虛弱腹痛

生料五積散

治產後內有餘血外感寒邪

脇脹痛

乾地黃湯

治產後兩脇滿痛兼除百病

蘇葛湯

療產後惡露不下血氣壅痞脇脹不食

當歸散

治產後腹痛脇肋脹滿

抵聖湯

治產後腹脇悶滿或嘔吐者

腰痛

當歸黃耆湯

治產後血失過多腰痛身熱自汗

如神湯

治產後瘀血腰痛

廣濟方

治產後虛冷血氣流八腰腿痛不可轉

桃仁湯

治產後惡露方行忽斷腰中重痛或流注兩股痛如錐刺此由血滯經絡

五香連翹湯

治產後瘀血腰痛作癰

頭痛

經效方

治產後肝經氣滯不平脇脹腹痛寒熱往來內執脯執

經效方

理血氣煩悶脇脹滿及痛

廣濟方

治產後腹痛氣脹脇下悶不下食

玄胡四物湯

治血癖腹痛及血刺腰痛

又方

即生料五積散加桃仁

寄生防風湯

治產後風邪頭眩腰痛四肢沉重



一 奇散 即芎 治產後血

二 芎散 治產後血

芎附散 治產後氣虛頭痛

加減四物湯 治產後頭痛血虛痰

通身疼痛

越痛散 治產後氣弱血

五積散 治產後身痛

加味四物湯 治產後血

大金丹 治產後身痛

脚氣

獨活寄生湯 治肝腎虛弱腹濕留風

大防風湯 治陰虛邪襲

卷之十二

外感風寒

加味芎歸湯 治產後外感風寒

竹葉湯 治產後中風發熱

中風

小續命湯 治產後中風身體緩急頑痺不仁

華陀愈風散 治產後中風及血暈不省人事

血風湯 治產後諸風

防風湯 治產後中風背項強急胸滿氣

雲岐方 治產後半身不遂言語蹇澀恍惚多忘精神不定

防風羊角湯 治產後氣血不足風邪所襲

川芎散 治產後中風如繩束狀

瘧瘧上丹 治產後去血過多氣無所至虛極生風

大豆紫湯 治產後風虛氣血不調等症

獨活酒 治產後中風

鷄天酒 治產後中風並男子一切風症

交加散 治婦人榮衛不通經脈不調產前後百病

一物獨活湯 治產後中風虛人不可服他藥者

羌舌散 治前同

發瘧 一作瘧

小續命湯 治產後汗多變瘧口禁齒強搖頭馬嘶不時舉發

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗及產後百病或中風非瘧脈緊大者不治

大豆湯 治產後中風發瘧婦人振挾風寒在表諸疾

羚羊角飲子 治產後氣實心煩渴欲飲水欲成剛瘧中風之疾

防風當歸散



痰癰

防風湯

治風虛發熱項背拘急恍惚任言亦治腳氣緩弱

華佗愈風散

方見中風

當歸散

治產後中風

增損紫胡湯

治產後手足牽搐濕潮昏悶

秦艽湯

前證去後方服此藥

拘攣

舒筋湯

治一切胸攣疼痛風濕所傷氣血凝滯

芎藭散

治產後中風筋攣急

防已膏

治產後中風身痺痺痺急

不語

八珍散

治產後停積敗血閉于心不語

胡氏孤鳳散

治產後開目不語

一方

治產後不語

逐血補心湯

治產後失音不語

狂言譫語

三聖散

治產後收血衝氣

奪命丹

治產後血熱心經語

調經散 治陰虛發熱瘀血

妙香散 治產後心煩刺

四物補心湯 治產後語

琥珀地黃丸 治產後語

顛狂

大聖澤蘭散 治血海虛冷久無子息及產後

抱龍丸 治產後過驚發狂

加味八珍湯 治產後血虛

調經散 方見前症

茯神散 治產後心神恍惚言

驚悸

加味四物湯 治產後症

恒子仁 治產後元氣虛

烏金散 治產後狂

寧神膏 治失血過多心神昏悶言語失常

辰砂遠志丸 治產後中風驚

見鬼神

琥珀散 治產後瘀血攻心

一方 治產後血暈

白茯苓散 治產後心驚



乾熱地黃散

治產後心驚

產乳七寶散

治產後調和氣血

人參散

治產後心驚

琥珀散

治血虛驚悸

茯苓散

治產後精神性亂

一方

治產後虛弱或汗下

歸脾湯

治產後血氣大虛驚悸

遠志丸

治產後心神驚悸腹中急痛夜間不寧

白茯苓丸

治產後心驚

恍惚

千金方

治產後暴苦心悸

經效方

治產後心虛驚悸

琥珀散

治產後中風恍惚心驚

遠志散

治產後中風心神恍惚

天麻丸

治產後中風恍惚

辰砂遠志丸

治產後中風消風化痰安神鎮心

卷之十三

產後下

虛煩

金黃散 治產後惡血衝心時發煩躁

川芎散 治產後餘血不盡衝心煩悶腹痛

經效方 治產後氣虛令搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿

治血氣煩悶雜方

竹葉湯 治產後短氣欲絕心口煩悶

薤白湯 治產後胸中煩熱氣逆

仲景二物黃芩湯 治在褥自發露得風四肢煩熱

經驗方 治產後煩躁

發渴

千金竹葉湯 治產後煩躁

熟地黃湯 治產後虛渴

清心連子飲 治產後心煩

荷葉散 治產後宿血不散衝心迷悶

集驗方 治產後血氣煩悶

沒藥丸 治產後心膈煩躁惡血不快

人參當歸湯 治產後去血過多陰虛內熱心煩短氣

甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣

芍藥梔子豉湯 治產後虛煩不眠

竹皮大丸 治產後中虛煩亂嘔逆

竹葉歸薤湯 治胃氣虛熱口渴

七味白朮湯 治中氣虛弱津少口渴

產寶方 治產後人渴不止



括蕢根湯 治產後血渴

黃芩散 治產後血渴

當歸補血湯 治產後血脫煩躁脉洪

一方 治

一方 治產後虛煩發渴

一方 治產後中風發渴

桃花散 治產後不煩而渴

自汗

黃耆湯 治產後虛汗不止

麻黃根散 同前

止汗散 治產後盜汗不止

當歸二黃湯 治產後白汗盜汗

當歸六黃湯 治產後汗不止

人參湯 治產後諸虛發熱盜汗

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒逆冷白利或臍腹疼痛吃逆汗多發痙

薯蕷湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口燥痰湧逆冷吐瀉虛寒等症

千金方 治產後風虛汗出四肢拘急難以屈伸

全生活血湯 治產後胃悶發熱自汗盜汗目眩四肢無力行步欹側

發熱

丹溪方 治產後發熱

加味四物湯 治產後陰虛發熱

抽薪散 治產後血虛發熱

人參散 治產後諸虛發熱盜汗

人參當歸散 治產後去血過多陰虛內熱

加味逍遙散 治產後發熱

犀角飲子散 治產後虛損發熱

三合散 治產後虛損發熱

往來寒熱

柴胡四物湯 治產後往來寒熱

增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱如瘧

增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱

更生散 治產後去血過多不止咳嗽眼暗口噤發熱增寒

大調經散 治產後惡露未消敗濁凝滯榮衛不調增寒發熱

黃龍湯 治產後傷風熱入胞中寒熱如瘧

小柴胡加生地黃湯 治產後脈弦往來寒熱

加減烏金散 治產後寒熱似瘧

產寶方 治產後寒熱口中生瘡乾嘔悶絕

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯

瘧疾

草果飲子 治產後瘧疾多熱者

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者



清脾飲 治瘧疾寒多熱少者

人參養胃湯 治虛寒多熱少者

七寶飲 治瘧疾久而不已者以此截之

瘧勞

白茯苓散 治產後瘧勞

黃耆建中散 治產後諸虛發熱惡寒腹痛

當歸建中湯 治產後虛羸不足腹痛腰痛自汗出

加味佛手散 治產後血虛盜汗咳嗽有痰

柴胡四物湯 治產後日久虛勞脉大

三合湯 治產後虛勞

雲岐熟地黃散 治產後四肢煩熱時發寒熱

黃耆丸 治產後虛羸熱頭眩虛寒

石子湯 治產後虛羸面色萎黃四肢疼痛

人參驚胃散 治產後虛羸熱咳嗽盜汗等症

胡氏牡丹散 治產後血氣所搏經後不調或血氣所搏經後不調

黃耆煮散 治產後虛勞熱  
猪腰子粥 治產後虛勞發熱

虛羸

補虛湯 治產後一切雜病以人參氣血為主

黃耆四物湯治產後血虛發熱惡寒

十全大補湯治產後血虛發熱惡寒

當歸羊肉湯治產後虛弱

黃雌雞湯治產後血虛

鹿寶方治產後虛弱

一方治產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不止

又方同前

瘡

見睨丸治產後虛弱飲食不進

腹脹

抵聖湯治產後血入胃腹脹滿嘔吐不能納穀

香砂養胃湯治產後血攻於脾

加味六君子湯治飲食停滯於脾

加味平胃散治產後腹脹

紫金丹治產後胸中嘔氣

又方同前

自聖散治產後腹中堅滿喘不得卧

浮腫



大調經散

治產後腫滿喘急

小調經散

治敗血乘虛停積流

經驗方

治產後遍身青腫

白朮湯

治心腹大如盤

正脾散

治產後通身浮腫及婦人

小調中湯

治產後

橘皮酒

治產後肌浮

丹溪方

治產後浮腫小便

奪魂散

治產後血虛

張氏方

治產後血虛

漢防已散

治產後血虛

七聖丸

治產後浮腫心脇脹

加味吳茱萸湯

治產後血虛

七聖丸

治產後

加味八物湯

治產後浮腫

四神散

治產後瘀血不

加減金匱腎氣丸

治產後腰重脚腫小便

積聚

河間芍藥湯

治產後

四神散

治產後瘀血不

一方

治產後血瘀作痛

桂心丸

治產後血氣不散

瘧疾方治血虛痛

千金方治血

霍亂

四生散治一切霍亂吐瀉

五苓散治霍亂渴而飲水者

理中丸治脾胃虛寒嘔吐泄瀉腹脹

白朮散治霍亂吐瀉腹脹

溫中散治產後霍亂吐瀉

附子散治產後霍亂手足逆冷

高良薑散治產後霍亂吐瀉

藿香正氣散治外感風寒內停飲食嘔吐泄瀉

來復丹治伏暑

一方治吐逆不受湯藥者

嘔吐

香靈丸治產後嘔吐不止者

蒲黃散治產後三四月惡露不下嘔逆壯熱

橘紅半夏湯治胃虛嘔逆

開胃散治產後胃虛嘔逆胸滿不食

薑末散治產後無他疾但嘔逆不食

石蓮散治產後胃寒嘔逆咳嗽腹脹



錢氏益黃散治脾胃虛寒水來侮土嘔

加味四君子湯治產後嘔逆不已

吃嘔

丁香散治產後心煩

羌活散治

一方治產後吃逆三五日不止

咳嗽

旋覆花湯治產後感冒風寒咳嗽喘

二母散治產後惡露上攻流

經效方治咳嗽多

喘急

雙料散治產後敗血衝

蘇合散治產後

一方治產後

集驗方治產後感冒

異效散治產後虛弱久患咳嗽腹

一方治產後咳

二味蘇合散治產後血八於

五味子湯

治產後喘促

旋覆花湯

治產後傷風喘嗽痰涎壅盛

見睨丸

治產後傷風喘促飲食而喘

六君加失笑散

治產後喘急瘀血上湧

大補湯

治產後百日外而一浮腫氣急有汗

鼻

加味參蘇飲

濟陰綱目目錄

卷之十四

泄瀉

調中湯

治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛洞瀉不止

葶藶理中丸

治產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉又治男子脾胃虛弱久瀉

神效參香散

治產後脾胃虛寒滑瀉不止及痢積已盡滑瀉不止

痢疾



救急散

治產後赤白痢腹中絞痛

白頭翁加甘草阿膠湯

治產後下痢虛極

黃連丸

治產後熱渴赤痢腹中痛

一方

治產後血痢不止餘血作痛兼埋屬寒滑者

神仙感應丸

治產後固無積痢多有因食重味早亦作痢者百無一生非此方不能救之

連翹丸

治產後久病赤白痢因脾胃不和致心腹脹滿乾嘔酸心飲食不下胸膈噎塞脇助疼重困

三聖散

治產後血痢不止

治產後諸痢雜方

四首

心效方

療產後痢渴飲無度數

經驗方

療產後痢久津液枯竭四肢浮腫口舌乾燥

大便秘泄

周氏方

治婦人產後產前大便不通

麻仁丸

治產後去血過多津液枯渴不能轉送大便

加味四君子湯

治產後赤白痢

槐連四物湯

治產後熱渴血痢腹痛

神效香散

方論見前

治產後血痢雜方

二首

經效方

療產後失痢津液調渴不止

七味白朮散

療產後痢津液竭渴不止

滋腸五仁丸

治產後血氣虛損大腸閉滯傳導艱難

阿膠枳殼丸

治產後大便秘滯

麻蘇粥

婦人產後有三種疾鬱胃則多汗汗多則大便秘故惟用藥麻蘇二子最為穩當

兵部手集方

治產後秘結不通膨滿氣急坐臥俱難

大小便不通

通氣散

治產後大小便不通

桃仁散

治勝脫氣滯血溢

枳殼丸

治產後大小便澀滯

一方

治產後大小便不利下血

金礪匙散

治產後大小便不通腹脹

遺尿

補遺方

療產後遺尿不知亦治遺尿

集驗方

產後遺尿亦治男子

加味補中益氣湯

治脾腎虛寒大便不禁

還少丹

治脾腎虛弱遺精

四神丸

治脾腎虛弱大便不實或五更作渴

五味子散

治腎泄

廣濟方

治產後遺尿亦治男子



淋閉

茅根湯

治產後諸淋無問冷熱骨石氣結悉主之

滑石散

治產後熱淋

滑石通淋散

產後小便緊澀不通因血熱結於小腸經水不利食熱勞之物而成淋也

石菖散

治婦人小便澀

加味四物湯

治產後血虛此聖效

一方

治產後諸淋小便痛及血淋

張氏方

治產後小便不通淋閉

療卒不得小便方

灸臍法

治產後小便不通腹脹如鼓則亂不醒蓋緣木產之前內穢治氣遂致產時尿胞運動不順

小便數

桑螵蛸散

治產後陽氣虛弱小便頻數及遺尿

括蕒散

治產後小便數兼渴

補遺方

治產後小便數及遺尿

小便不禁

千金方

治產後小便不禁

又方

治產後小便不禁

鷓鴣內金散

治產後溺尿失禁

鹿濟方

治產後小便不禁

黃耆湯

婦人產後尿不禁而微浮者服

固脬散

治婦人臨產時手傷脬破小便不禁

補脬飲

治產後傷動脬破終凡不可小便但淋瀝不乾

小便出血

血餘散

治產後小便出血

滑石散

治產後小便出血

崔氏方

療產後血入大小腸

補遺方

治產後小便出血

大便出血

加味清胃散

治因膏梁積熱便血

的奇散

治產後月經不行餘血瘀

當歸黃耆散

治產後陰脫謂陰戶脫下也

加味八珍湯

治產後生

加味四物湯

治因產用力過多陰門突出

當歸散

治陰下脫又名顏廬

硫黃散

治產後努力太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛舉動房勞皆能發作清水續續小便淋瀝

烏椒湯

治陰下挺出

寸金散

治婦人子



**復元湯**

治產後子宮不收

**一方**

有臨產子腸生出血後腸不收者日服湯化產

**一方**

產後山俗用冷水喫時向其腸日收虛弱之人切不可用恐驚怯成病或即脫絕以此方治之

**又方**

治腸出久而不收為風吹乾不能收者

**丹溪方**

治產後腸不收

**雜方**

治盤腸產

**又方**

計一首

**灸法**

計五首

**產門不開腫痛**

**十全大補湯**

治產後血氣大虛陰門不開發熱惡寒

**疏黃湯**

治產後五門不開

**欬陰法**

治新產後陰腫下胎及產門不合

**當歸湯**

治產後腹中風冷陰戶腫痛

**一方**

治婦人子宮大痛不可忽產後生腸不收

**桃仁膏**

治產後陰腫妨悶

**一方**

治產後陰腫

**萬應丸**

治產後小戶痛不可忍

**一方**

治產後陰內兩傍腫痛手足不能舒伸者

**乳汁不行**

**通草湯**

治產後血氣盛乳汁不通

漏蘄散 治婦人肥盛氣脈壅滯乳汁不通或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫將欲成者此藥服之自然內消乳汁通行

必得湧泉散 治乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯或作癰腫

湧泉散 治乳汁不通不問虛盛先用梳刮乳房後服藥

產寶方 治產後乳無汁  
胡桃散 治婦人少乳及乳汁不行

早角散 治乳汁不通及乳結硬腫痛  
張氏方 治益氣脈榮衛行

雜方 計五首俱下乳汁  
加味四物湯 治氣血虛乳汁不通

玉露散 治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便秘滯此藥涼膈壓熱不乳

當歸補血加葱白湯 治產後無乳  
通脈散 治女人乳少

通乳湯 治乳後氣血不足經血衰弱乳汁滯少  
一方 治乳汁不通

猪蹄湯 治婦氣少力衰乳汁滯不行絕乳汁  
立效散 治下乳

又方 治乳汁少  
鍾乳散 治乳婦氣少血衰脈滯不行乳汁絕少

雜方 計二首



乳汁自出

漏蘆散 見前

二方 治婦人血氣方盛乳房作脹或無見食乳要消

免懷湯 欲摘乳不通其月經則乳汁不行

吹乳癰腫

消毒飲 治吹乳乳癰井便毒如憎寒壯熱不痛

連翹飲子 治乳癰

一方 治血脈凝注不散結成吹乳乳癰痛腫不可忍

又方 治婦人乳中結核

內托升麻湯 治婦人兩乳間出黑頭瘡項陷不作黑眼並乳癰初起亦治

清肝解鬱湯 治肝經虛血風熱鬱火傷血結核為腫為潰

一方 治乳榮破則少生必大補

一方 治乳硬痛

金銀花散 治乳癰腫疼痛不可忍

丹溪方 治乳腫痛

一方 治乳癰始勞嗽腫

一方 治乳有核

復元通氣散 治婦人乳癰腫毒

治乳癰方

神效瓜蒌散 治婦人乳癰乳岩神效

定物湯 治乳癰五發散

橘香散 治乳癰已結未結痛極不可忍藥下神驗

一方 治乳癰

二灰散 治產後乳汁不泄結帶不消熱毒

獨勝散 治婦人吹妳初覺身熱頭疼寒熱及胸乳腫硬

又方 計三首

一方 治乳癰及無名腫熱

葱熨法 治吹乳乳癰

一方 治乳癰

雜方 廿二首 治吹乳乳癰

乳妬

追翹湯 治產後妬乳并癰音若下之

目錄

括葉散 治吹乳

補遺方 治吹乳結實腫痛

通和湯 治婦人乳癰疼痛不可忍

夜陰散 治吹乳乳癰

一方 治婦人吹乳頸腫身發熱增寒疼痛難忍不進飲食者

勝金丹 治吹乳結核不散腫神效

敷乳方

一方 治吹乳

柳根熨法 治乳癰二三百日衆癢不痊但兼紫青色

瓜蒌散 治乳初結脹不消合散乳自退



一方 治姑

赤龍皮湯 治姑

天麻湯 治姑乳亦洗浸諸黃爛熱瘡

飛鳥散 治乳頭生瘡及諸熱浸淫丈夫陰蝕瘡

黃連胡粉膏 治乳瘡並諸濕

鹿角散 治婦人乳頭生瘡

補遺方 婦人乳頭小

乳巖

青皮散 治乳巖初起如驚棋子不痛不

益氣養榮湯 治即變及勞傷血氣兩乳或四肢腫

木香餅 治一切氣滯結腫或痛或

乳巖

此方治產後瘀血上攻忽兩乳仲長細小如

目錄終

濟陰綱目卷之一

關中 武之望叔卿父輯著 錢塘 張志聰隱菴父訂正

西陵 汪 淇 懋 漪 子 箋 釋 天都 查 望 于 周 父 叅 閱

調經

論經主衝任二脉

任脈主任一身之陰血室太衝屬陽明為血之海故穀氣盛而血盈滿而月事以時下大直天一也天一之氣升而為主降而為癸壬陽而癸陰也三旬一見者為一小會之週大此其常也然有大

良方論曰岐伯云女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣癸謂壬癸之水故云天癸也然衝為血海任主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下常以三旬一見以象月盈則虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後症相類若被驚恐勞役則血氣錯亂經脉不行多致勞瘵等疾若逆於頭面肢體之間則腫痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血



會中會之不  
同故又有三

月一行一年

一行之變

究其盈虧之

義則一也

有數年不行

而一行即變

娠者又超於

理之外

監化能為最

胆氣化液而

生即水八千

經其血乃生

之意此榮出

中焦也故曰

生化之源

統血者脾氣

化液入心而

交此為血也

癰癰癰癰若經血內滲則竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變症

百出犯時微若秋毫成患重於山岳可不畏哉

○論心脾為經血主統

薛立齋曰經云飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於

肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣先生所謂脾為

生化之源心統諸經之血誠哉是言也心脾平和則經候如常苟

或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動

則月經不調矣大抵血生於脾土故云脾統血凡血病當用苦甘

之藥以助陽氣而生陰血也

○論脾胃生血

薛立齋曰血者水穀之精氣也和調五臟灑陳六腑在男子則化

化液入心而交此為血也

故誰心之所  
化生

知水穀之精  
氣是生血之

本則知脾胃  
是生血之源

而血不主者  
不可導主四

物矣  
千金云婦人

經行如廁亦  
有為風所客

者不可不知  
經云三陽之

為精在婦人則上為乳汁下為月水故雖心主血肝藏血亦皆統  
攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲  
食亦然

○論經不調由風邪客於胞中

陳氏曰婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脉損

手太陽少陰之經蓋衝任之脉皆起於胞中為經絡之海與手太

陽小腸手少陰心經為表裏上為乳汁下為月水然月水乃經絡

之餘苟能調攝得宜則經應以時矣

○論三月一來為居經

脉經云師曰脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可否者

此為居經三月一來曰寸口脉微而澀微則衛氣不足澀則血氣



不月此則又兼小腸而言

然小腸不與心為合

可謂經者

以心為合

此言經者

血脈之

經

此言脈微

此言脈微

此言脈微

此言脈微

此言脈微

此言脈微

此言脈微

此言脈微

此言脈微

此言脈微

無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛言諸謬誤

跌陽脉浮而滿濇則衛氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣澀則失

少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不來此為居經

三月一來問以婦人妊娠三月師脉之言此婦人非軀今月經

何以別之師曰寸口脈衛浮而大榮反而弱浮大

則氣強反弱則少血孤陽獨旺陰不能吸一氣不併衛降榮竭陰

為積熱陽為聚熱陽盛不泄經脉不足陰虛陽往實故令少血

咽燥汗出或溲稠數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故

知非軀言煩滿血月京一經三月一來陰盛則瀉名曰居經脉浮

人左脉

反弱也

此言居經之治

盛地氣不足故曰支也舉寸以故知耳此言陽脈浮太陰脈反弱之居此專主內經而言以相火寄于肝也男之氣皆從此出觀天地之氣始于春則知人欲之義必由于肝也烏獸孳尾亦然故治此病當以柴胡湯為法其如氣治法須臾證據後

羅謙甫曰宋褚澄療婦人寡婦別製方者蓋有謂也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒年熱全類溫瘧久則為勞腎讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背寒熱眾醫皆以為寒熱病倉公曰病得之欲男子不得也何以知診其脈肝脈弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為主男子精盛以思室女人血盛以懷胎也夫肝攝血者也厥陰肝脈弦出寸口上魚際則陰盛可知故知褚氏之言信有謂矣

○論調經當加氣

濟生方論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒哀思悲恐驚者七氣也七情以外益心以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身



方治之故此  
不備列

矣

血隨氣行。氣一滯。則血與氣併。或月事不調。心腹作痛。或月事將行。預先作痛。或月事已行。淋瀝不斷。心腹作痛。或遵腰脇。或引背臂。上下攻刺。吐逆不食。甚則手足摘掣。狀類驚癇。或作寒熱。或為癰疽。肌肉消瘦。非特不能受孕。久而不消。轉而為瘵疾者。多矣。

○論調經元病

李氏曰。月水循環。纖痼不作。而有子。若兼潮熱腹痛。重則加之咳嗽汗嘔。或瀉。有潮汗。則血愈消耗。有咳嘔。則氣往上行。瀉則津偏於後。痛則積結於中。是以必先祛病。而後可以滋血。調經。就中潮熱疼痛。尤為婦女常病。蓋血滯積入骨髓。便為骨蒸。血滯積瘀於中。與日生新血相搏。則為疼痛。血枯不能滋養百骸。則蒸熱於外。血枯胞絡火盛。或挾熱氣。積寒冷邪。則為疼痛。

析理無餘論  
症極確鑿能  
悉此何思不  
良

○論調經大法

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通之  
中。有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四也然四者若細推之不  
調之中有趨前者有退後者則趨前為熱退後為虛也不通之中  
有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時  
作痛者有經前經後作痛者則常時與經前為血積經後為血虛  
也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積  
經行為血虛有熱也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思  
忿怒外因飲冷形寒益人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱  
結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經候不調  
不通作痛發熱之所由也人抵氣行血行氣止血止故治血病以



以類字推之  
則所該者廣  
幸母執也而  
爲先爲佐尤  
所當知

濟世利人  
行氣爲先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝結。故治血病以熱藥爲佐。肉桂之類是也。

○論經水異色

丹溪曰。經水者陰血也。陰必從陽。故其色紅。稟火色也。血爲氣之配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。氣凝則凝。氣滯則滯。氣清則清。氣濁則濁。上應於月。其行有常。名之曰經。爲氣之配。因氣而行。成塊者。氣之凝也。將行而痛者。氣之滯也。來後作痛者。氣血俱虛也。色淡者。亦虛也。而有水泄之也。錯經妄行者。氣之亂也。紫者。氣之熱也。黑者。執之甚也。今人但見其紫者。黑者。作痛者。成塊者。率指爲風冷。而行溫熱之劑。則禍不旋踵矣。良由病源論月水諸病。皆曰風冷乘之。宜其相習而成俗也。或曰黑者。北方水色。

况元

明二公之說

用証相泰尤  
勉的確

也紫淡於黑非冷而何予曰經云尤則害承乃制熱甚者必兼水  
化所以熱則紫甚則黑也塊婦人性熱而見鄙嗜欲加倍臟腑厥  
陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之益不  
百兩一二也

準繩云冷症外邪初感入經必痛或不痛者久則鬱而變熱矣  
且寒則凝既行而紫黑故非寒也○葉氏曰血黑屬熱丹溪之  
論善矣然風寒外乘者十中常見一二何以辯之蓋寒主引澀  
小腹內必時常冷痛經行之際或手足厥冷唇青面白尺脉或  
遲或微或虛或雖大而必無力熱則尺脉或洪或數或實或雖  
小而必有力於此審之可以得其情矣

李氏曰心主血故以色經為正雖不對明而色正者易調其色紫



者風也。黑者熱甚也。淡白者虛也。或挾痰停水以混之也。如米泔水如屋漏水如豆汁或帶黃混濁模糊者熱痰也。成塊作片血不變者氣滯也。或風冷乘之也。色變紫黑者血熱也。大紫紫者四物湯加防風白芷荆芥黑者四物湯加芩連香附淡白者芩歸湯加參芪白芍藥香附有痰者二陳湯加芩歸如烟墜者二陳湯加秦艽防風蒼朮如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附玄胡索枳殼陳皮隨症選用。

論經候愆期

王子亨曰。經者常候也。謂候其一身之陰陽愆伏。知其安危。故每月一至。太過不及皆為不調。陽太過則先期而至。陰不及則後時而來。其有仁多仁少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致。

丹溪翁只主一執字而熱

症附又用若

水南星等誰

其信之立藥

又分肝脾血

分勞役五種

尤為詳明

愚謂脾虛氣

微宜歸脾湯

脾實氣鬱宜

越鞠丸之類

為當

血生於脾故

色淡者宜補

脾胃此白朮

所必用也而

丹溪以黃歸

為配不用地

黃為藥者最

丹溪云經水不及期而來者血熱也。四物湯加蒼朮香附。○肥人

不及日數而多者痰多血虛有熱。南星白朮蒼朮黃連香附川芎

作丸。○薛氏曰先期而至有因脾經血燥者宜加味逍遙散。○有

因脾經鬱滯者宜歸脾湯。○有因肝經怒火者宜小柴胡湯加生

地黃。○有因血分有熱者宜四物湯加柴胡牡丹皮山梔子。○有

因勞役火動者宜補中益氣湯

丹溪云經力過期血少也。用川芎黃歸人參白朮兼痰藥治之。○

過期色淡者痰多也。二陳湯加黃歸。○過期紫黑有塊血熱也必

作痛。四物湯加香附黃連。○薛氏曰過期而至有因脾經血虛者

宜人參養榮湯。○有因肝經血少者宜六味地黃丸。○有因體虛

血弱者宜八珍湯



無深意焉如  
立齋養榮八  
珍等湯但本  
于此其用六  
味丸者又為  
補母之法宜  
詳

○論月水多少

準繩云婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發疼痛者不  
審一例呼為經病不知陽勝陰陰勝陽所以服藥無効蓋陰氣乘  
陽則包藏寒氣血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少  
而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢  
故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯為福也○陽勝陰月候  
多者當歸飲陰勝陽月候少者七沸湯○又云經水過多為虛熱  
為氣虛不能攝血經水澀少為虛為澀虛則補之澀則濡之  
脉經曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰曾更下利  
若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令經水反少設經  
下多於前者當所苦困當言恐大便難身無復汗也

津液滑水穀  
陰氣也亡之  
則血失所養  
疾故不如前  
焉

茲與沈主氣  
病  
滑為實絕為  
虛

○論月水不利

良方云婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而風冷客於胞內傷於衝任之脈故也若寸脈弦關脈沉是肝病也兼主腹痛孔竅生瘡尺脈滑血氣實經絡不利或尺脈絕不至兼主小腹引腰痛氣攻胸膈也

薛氏曰前證屬肝膽二經蓋肝胆相為表裏多因悲怒所傷若本經風熱用補肝散方見脇痛門血虛用四物加酸棗仁若腎水不足用六味丸若患諸瘡瘍治見後

○論月水不斷

準繩云婦人月水不斷淋漓無時或因勞損氣血而傷衝任或因經行而合陰陽皆令氣虛不能攝血若時止時行腹痛脈沉細此



不斷下血行  
何分別臨症  
宜細詳言

寒熱邪氣客於胞中。非因虛弱也。薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用歸脾湯。恚怒傷肝。用逍遙散。肝火妄動。用加味四物湯。脾氣虛弱。用六君子湯。元氣下陷。用補中益氣湯。熱傷元氣。則湯加五味。麥門冬。炒黑黃蘗。

論過期不止

產寶云。男子生於寅。寅屬木。陽中有陰。故男子得八數。女子生於申。申屬金。陰中有陽。故女子得七數。男以氣為主。八八則卦數已盡。女以血為主。七七則卦數已終。終則經水絕。衝任脈虛衰。天癸絕。地道不通。而無子矣。或勞傷過度。喜怒不時。經脈衰微之際。又為邪氣攻衝。所以當止不止而崩下也。許學士云。婦人經脈過期不止。腰腹疼痛。或七七數盡而月經下者。宜用當歸散治之。

據此宜用十  
全大補八珍  
湯人參養榮  
湯之類

○論經病疼痛

經水者。行血氣通陰陽以榮於身者也。氣血盛陰陽和則  
形體通。或外虧衛氣之充。或內乏榮血之灌。血氣不足。經候欲  
行。身體先痛也。此論身痛

良方云。婦人經來腹痛。由風冷客於胞絡。衝任或傷於太陽。少陰

經。用溫經湯。桂枝桃仁湯。若憂思氣鬱而血滯。用桂枝桃仁生地

黃通經丸。方見經閉若血結而成塊。用萬病丸。

丹溪云。經水將來作痛。有血實也。一云氣滯。四物湯加桃仁香附

黃連。○臨行時腰疼腹痛。乃是鬱滯有瘀血。四物湯加紅花桃仁

莢。木玄胡索木香。有熱加黃芩柴胡。○經行後作痛者。血氣俱虛

也。以八珍湯加減服。○戴氏曰。經事來而腹痛者。經事不來而腹

有加香附香  
皮桃仁烏藥  
丹皮小茴五



靈暗者

思致王夫更  
進一層

此全以脉為  
主不然亦非  
此藥可全

亦痛者皆血之不調故也欲調其血先調其氣四物湯加吳茱萸

半錢香附子一錢和氣飲加吳茱萸半錢亦可痛甚者玄胡索湯

然又恐感外邪傷飲食致痼痛不因血尤宜詳審和氣飲即能根

治因冷而積因積而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門冬不用

汪石山治一婦人瘦少年二十餘經水紫黑色或前或後臨行腹痛

是氣滯也或時感寒腹亦作痛脉皆細滿近滑兩尺重按畧洪而

滑此血熱也或謂惡寒如此何謂為熱曰熱極似寒也遂用酒煮

黃連四兩香附歸身尾各二兩五靈脂二兩為末粥丸空腹吞之

而愈

○一婦年二十一歲六月經行腹痛如割難忍求死脉得細軟而

駛尺則沉弱而近駛汪曰細軟屬淫數則為熱尺沉屬鬱滯也以

往所說可  
書則豈可公

也。經曰母使  
過之傷此是

故。黃連久服之

三句俱欠妥  
惟明氣有邪

故不為壯衰  
者不治此性

血脫陽無所  
附故脉無之

不當言不為  
血減

亦是寒濕太

酒煮黃連半觔炒香附六兩五靈脂半炒牛生三兩歸身尾二兩  
為末粥丸空心湯下三四錢服至五六料越九年得一子後屢服  
屢効歷十五年後前藥罔効往復診之脉皆洪滑無力幸其尚有  
精神注曰此非舊日比矣舊乃鬱熱今則虛寒東垣曰始為熱中  
終為寒中是也經曰脉至而從按之不鼓乃陰盛陽陽當作寒治  
且始病時而形斂小今則形肥大矣書曰瘦人血熱肥人血虛豈  
可同一治也所可慮者汗大泄而脉不為汗衰血大崩而脉不為  
血減耳其痛日重夜輕知由陽虛不能健運故亦凝滯而作痛以  
證參脉宜用助陽若得脈減痛輕方為佳兆遂投參芪歸朮大劑  
加桂附一貼來早再診脈皆稍寧服至二三十貼病且愈蓋病有  
始終寒熱之異藥有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈可以



過所謂以藥  
醫藥可服此

混補之劑三  
十服也

一方而通治哉

○論經病發熱 附客熱

造造散為正  
熱藥須去  
加減

三方更妙

以病未深故  
行效耳

苓二兩四製香附一觔蜜丸服

○吳菱山治一婦經血過多五心煩熱日晡潮熱諸藥不效以四  
物加胡黃連三服而愈

李氏曰潮熱有時為內傷為虛無時為外感為實虛者大溫經湯  
熱者四物湯加柴胡黃芩經闕者滋血湯骨蒸者大胡連丸大烏  
雞丸五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者茯苓補心湯有汗  
者逍遙散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經  
後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加生地黃此藥加減  
為退熱聖藥尋常潮熱者腎氣丸大造丸或四物湯料加便炒黃

凡在陰宮及  
兩月一度上  
休以來

客邪而補中  
虛氣須細心  
休認施用相  
參必真虛者  
方可不然恐  
難實實之害

薛新甫治一婦人經候過期發熱倦怠或川四物黃連之類反  
兩月一度且少而成塊又川峻藥通之兩日如崩所蔽薛曰脾為  
諸陰之首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於胃矣  
遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾胃年餘甚愈人全云客熱  
者因體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上  
焦胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

薛氏曰前證持客邪所侵補中益氣加用羌防風肝虛血少六味  
地黃丸胃火飲冷錢氏瀉黃散胃虛飲湯七味白朮散熱時熱  
八珍湯助熱內熱迢迢散發熱體倦補中益氣湯甚怒發熱小柴  
胡湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯

論往來寒熱



有熱入血室之象

諸症皆見在

少陽經用此

湯此經多氣

少血何篇不

用當歸亦助

生地

經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡以去其寒熱後以四物湯和之。薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治之諸病悉退。

大全云師尼寡婦與室女出嫁逾期不月經心前而不遂厭厭

成病乍寒乍熱久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風腦氣昏悶面

野瘦瘠等證皆寡婦之病也。薛氏曰前證若肝脉弦出魚際用

小柴胡加生地黄送下生地黄丸久而血虛佐以四物湯。若兼

怒動肝火而寒熱者佐以加味逍遙散。一婦人因夫經閉久不

歸發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥反潮熱內熱汗盜汗

月經頻數余曰經傷氣血虛也經頻肝脾虛也服歸脾湯六味丸

此翁公治欲男子不得之法也此婦連身慾火降之病而亦是正治大經寒涼藥多須防不

邪入血分故  
發狂者且譫  
語屬胃經者  
多悲悲犯之  
故云然

凡遇此症須  
當問此

而愈

論熱入血室

良方云婦久傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜暮則譫語有如  
痺狀此為熱入血室治者無犯胃氣及上二焦宜服小柴胡湯若  
脈遲身涼當刺期門穴下鍼病人五吸停鍼良久徐徐出鍼凡鍼  
期門穴必瀉勿補肥人二寸瘦人寸半也

○許學士治一婦病傷寒發寒熱遇夜則如見鬼狀經六七日忽  
然昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困許視之曰  
得病之初曾值月經來否其家云經水方來病作而經遂止得一  
二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從曰昨不省人事許曰此乃熱  
入血室證仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明了暮則



明知熱入血  
室乃因症而  
先治痰所謂  
急則治標後  
治其本也

使不能鍼或  
用桃仁承氣  
合小柴胡亦  
可

譏語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以剛劑與之  
遂致胸膈不利涎潮土腕喘急息高昏冒不知人當先化其痰後  
除其熱乃急以一呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次投以小  
柴胡湯加生地黃三服而熱除不汗而自解矣

一婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥治之數日遂  
成血結胸或勸用前藥許公曰小柴胡已遲不可行也無已用期  
門穴斯可矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或問熱入血室  
何爲而成結胸也許曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行遇  
經水適來適斷邪愈乘虛入於血室血爲邪所迫上入肝經肝受  
邪則譏語而見鬼復入膈中則血結於胸中矣何以言之婦人平  
居水養木血養肝方未受孕則下行之爲月水既孕則中畜之以

凡診婦人先問經候有無此是關脈凡經行後似症謬語便是熱入血室

病根在腹急痛

養胎及已產則上壅之以爲乳皆血也今邪逐血併歸於肝經聚於臍中結於乳下故手觸之則痛非藥可及故當刺期門也

○虞恒德治一小婦夏月行經得傷寒似瘧謬語狂亂諸醫皆以傷寒內熱投雙解散解毒湯服之大汗如雨反如風狀次以牛黃

丸金石之藥愈投愈劇一日延虞診視脈弦而大虞思傷寒內熱狂亂六陽俱病豈不口乾舌黑况脈不數病體捫之或熱或靜其

腹急痛意必有內傷在前傷寒在後今傷寒得汗雖已內傷則尚

存故也因細問之患者曰正行經時因飲食後多汗用冷水抹身

因得此證方知冷水外閉其汗內阻其血邪熱入室經血未盡血

得邪熱乍靜乍亂寒熱謬語掉眩煩風須得玉燭散下之而愈下

後謬語已定次以四物小柴胡湯調理五日熱退身涼思遂瘳



以脉六七至  
明知是熱滿  
則知其爲有  
瘀血寸大尺  
小上焦有熱  
此亦熱陽明  
胃府病以類  
赤口乾不了  
了而用後桂  
亦人所難須  
慎之

五味乾姜以  
成痼故可加

衍義云一婦人溫病已十二日論之其脉六七至而滿寸稍大尺  
稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬  
少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服  
之二日又與小柴胡湯加官桂乾薑一日寒熱遂止又云臍下急  
痛又與抵當丸微利臍下痛瘥身漸涼脉漸勻尚不了了乃復與  
小柴胡湯次日但胸中熱躁口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利  
次日心下痛又與大陷胸湯半服利三行次日虛煩不寧時妄有  
所見復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯  
去其煩熱其夜大便自通至晚兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩  
盡解但咳嗽唾此肺虛也若不治恐成肺痿遂與小柴胡湯去人  
參大棗生薑加乾薑五味子湯一日咳減二日而病悉愈此皆用

等則誤矣

仲景方

以感冒故發  
散以諸藥故  
清涼然云前  
用寒涼降火前證益甚更加月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎  
自出此脾胃虛寒用香砂六君子脾胃漸健諸證漸退又用歸脾  
湯而全愈

論經行泄瀉

汪石山治一婦經行必瀉三日然後行診其脉皆濡弱此脾虛也  
者不可以是  
而造次也慎  
之  
濡弱二字足  
推脾虛此脾  
氣虛而其脾  
血虛也用藥  
當矣而血虧

既勸則虛而不能運行其濕令作參苓白朮散每服一錢一日米  
飲調下二三次月餘經不瀉矣

○一婦年逾四十形長色脆病經不行右脉浮軟而大左脉虛軟



不運之說矣

據語帶語明  
是脾虛下陷  
而血平大  
誤人誤

虛萬意當用  
血中益氣加  
補和仲扶

而小近駛常時經前作泄今年四月感風咳嗽用湯洗浴多因  
泄一月六月復因洗浴發瘧六七次瘧雖止而神思不爽至八月  
益而經水過多白帶時下瀉泄覺右脚疼痛右臂閃脚脚腿則  
假此延痛髀腿腰脇尻骨頸項右邊筋脉皆掣痛或咳嗽一聲則  
腰眼痛如腰札日輕夜重叫號不止幸痛稍止飲食如常今詳月  
水過多白帶時下日輕夜重瀉泄無時亦屬下多亡陰宜作血虛  
論治服四物止痛之劑益甚九月汪復診視始悟此病乃合仲是  
所謂陽生則陰長之法矣夫經水多白帶下常泄瀉皆由陽虛陷  
下而然命曰陽脫是也日輕夜重蓋日陽旺而得健運之職故血  
亦無疑滯之患而日故輕夜則陰旺而陽不得其任失其健運之  
常血亦隨滯故夜重遂以參朮助陽之藥煎服五七貼痛減此亦

血中益氣加  
補和仲扶  
脈法

病證之變治法殊甚故記之

○脉法

滑為氣血行  
餘故曰實  
微弱為血不  
足浮弱亦然  
○弦也沉也  
斷還也皆生  
痛而不利而  
孔竅生瘡上  
攻胸臆當別  
之  
沉緊為寒在  
血分

脈經曰尺脉滑血氣實婦人經脉不利○少陰脉弱而微微則少  
血○寸口脉浮而弱浮則為虛弱則無血○脉來至狀如琴弦苦  
少腹痛主月水不利孔竅生瘡○肝脉沉主月水不利腰腹痛○  
尺脉來而斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也  
○經不通繞臍寒疝痛其脈沉緊此由寒氣客於血室血凝不行  
結積血為氣所衝衄血與故血相搏故痛

○調經通用諸方

此方加法便  
是四時妙理  
倍當歸以迎  
春氣倍川芎  
以迎夏氣倍

四物湯 治婦人衝任虛損月水不調經病或前或後或多或少

或臍腹疔痛或腰足中痛或崩中漏下及胎前產後諸證常服



為藥以迎秋  
倍地黃以迎  
冬用芍藥以  
生一陽用芍  
藥以生一陰  
皆升降之行  
也識之識之

益藥銜滋氣血若有他病隨證加減

當歸 利血如血刺痛如  
刀割非此不能除

川芎 治風泄肝本如血虛  
頭痛非此不能除

芍藥 利血理脾如腹中虛  
痛非此不能除酒炒

熟地黃 補血如臍痛非此  
不能除酒洗用

右劉各等分每服四錢水煎服。春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃

冬倍當歸。夫春生夏長秋收冬藏者四時生物之功也。物順四時

物陽者其氣無精意於其間哉。如常歸之甘辛溫潤可喻春日之和

融川芎之辛溫而散可喻夏令之敷榮。此生長之用也有生長而

不為收藏則何以成物。故用白芍之酸收以成秋。熟地之味厚以

成冬。此又收藏之妙矣。然四時之中以甘為土德之用。故歸地之

甘以和之。此又五行之不離乎土也。昔海藏云如用血藥當於四

物湯中擇其一二可也。又豈無意哉。故如行血則用芍歸以行春

夏之令。如欲止血則用地芍以行秋冬之令。此又升沉之道也。觀

其物者苟無主宰於其間則初無物矣  
自四物奚為哉故元神胃氣尤為喫緊者也

若春則防風四物加防風倍川芎

若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥

若秋則門冬四物加天門冬倍地黃

若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微汗而惡風四物加葳蕤謂之腹痛六合

若風眩暈加秦芫羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力疋然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合氣不足而用泄

氣之藥加平當以參芪易之

若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合

若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒六合



若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合

若婦人筋骨肢節疼及頭痛脉弦憎寒如瘧宜治風六合四物湯加羌活防風

若血氣上衝心腹脇下滿悶宜治氣六合四物加木香檳榔

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜立胡六合四物加玄胡索苦練虛者宜此

若氣衝經脉月事頻併臍下多痛宜倍芍藥加黃芩

若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澀也加玄胡苦練鮮少木香

檳榔

若婦人血虛果凝之故腹痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯更有妙者

補下元更有妙者加乾薑甘草

氣築小腹痛加立索

再斟酌

若腹中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥

若腹痛作聲經脈不快以血虛寒故加熟地黃一倍添桂心半倍

經行腹痛腰背痛加薑薑平膝紅花吳茱萸菴蘭甘草銀器燈心水煎

熱服

若經水澀少加葵花煎又加紅花血見愁

若經水少而色和者倍加熟地黃當歸

宜審候

若經水暴下加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩

若經水如黑豆汁者加黃芩黃連

經水過多別無餘證且黃芩六合湯四物湯黃芩白朮等分

凡造藥宜焦黑

經血淋漓不斷加乾薑蓮房炒入藥

齊合調

六二調給

十六



交合經行宿  
法

須識表證更  
有次序可法

以虛冷而崩  
中加艾令  
人不問冷熱  
而皆用膠艾  
殊可笑也

陰陽交合經脉行加赤石脂黃芪肉桂百草霜鹿角散櫻灰肉豆  
蔻當歸木香龍骨白茯苓白朮地榆

若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小柴胡湯以去其寒熱  
後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變證表邪猶在不  
能效也依前論中變證隨證用藥調治

若血弱者加生地黃蒲黃

補血佳崩加百草霜櫻灰首縣灰蒲黃炒過龍骨白薑

血成片加地黃藕節血黑片加人參白朮

若血臍虛冷崩中去血過多加阿膠艾

月水不調血崩或多或少或前後嘔逆心膨加陳艾黃芪心膨宜審

若赤白帶下宜香桂六合四物湯加桂枝香附各減半

婦人白帶夏加白淫淫濁加龍骨地黃骨黃芩如漏下五色研麝香

若赤白帶下宜香桂六合四物湯加桂枝香附各咸半

此皆古法宜  
體說的確方  
可遵之

以經閉而用  
利水之藥何  
也豈非以下  
焦氣滯而道  
之耶

四物湯為細末蜜煉九糖子大空心米飲湯下三四十九泊高年  
婦人白帶良驗如白淫濁加龍骨地黃當歸如漏下五色研麝香  
好酒下如鮮紅溫酒鹽湯下如帶下加肉桂蒲黃百草霜甘草黑  
豆白朮玄胡索白薑龍骨空心鹽酒下如白帶加白龍骨酒下

若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆炒烟盡各等分

若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等分王石膚云熟地黃  
滯血安能止痛不若以五靈脂代之

血滯不通加桃仁紅花

經閉加枳殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子

車前子

血寒用此藥善

血寒加甘草烏梅柴胡柳枝



野苧入漾藥

月經久閉加肉桂甘草黃芪黃蘗子木通紅花

月水不通加野苧根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎血氣不調加吳

茱萸等分甘草減半

諸虛不足加香附子

四物湯加甘草半兩為細末煉蜜丸每兩作八九酒醋共半盞煎

湯同化調下名當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一服無

時

若虛熱病四物湯與參蘇飲相合名補心湯主之添柴胡名五神

湯大能補虛退虛熱

潮熱加黃芩地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩人參

虛熱口乾加麥門冬黃芩

以甘龍和脂  
生液養血也  
惟氣不足者  
宜之如夢調  
氣宜倍香附  
最妙

虛熱口乾加麥門冬黃芩

虛渴加人參乾葛烏梅括實根

虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各減半

虛寒潮熱加柴胡地骨皮白木茯苓甘草秦艽知母黃芩麥芽貝

母人參烏梅棗子

與芩米訣配  
意見自超然

若四肢腫痛不能舉動宜以芩米各半湯主之

必有濕熱且

若大便秘結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散主之

若流溼潤燥宜四物理中各半湯

若氣血俱虛四物與四君子湯各半名八珍湯主之加縮砂仁保

胎氣令人有子有熱加黃芩

若謂熱生風  
當清熱溫不

若因熱生風者加川芎柴胡防風

清熱而散鬱  
熱當以意逆

血氣勞加荊芥柴胡

非清勞乃行肝膽之氣血結滯生熱也與用  
青蒿同



之

血風兩脇築痛或盤腸成塊加大黃草撥乳香

乃治癰瘰妙藥

血弱生風四肢痺痿行步艱難加人參乳香沒藥麝香甘草五靈

藥

脂羌獨活防風荆芥地龍南星附子澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下

下三節俱治血風而交証

血風腫脹加甘草木香枳殼馬兜鈴葶藶紫蘇藿香地黃空心服

不同用藥力異自當心悟

臟腑秘加大黃桃仁

滑泄加官桂附子以四物治瀉人所不信學者當知

嘔加白朮人參一方有生薑

嘔吐不止加藿香白朮減半人參再減半脾胃虛寒所至

以嘔吐嘔逆而所加藥固是矣然臨用物同用然乎否乎

嘔逆飲食不入加白朮丁香甘草人參宿砂益智仁胡椒

古人治欬多用人參五味

若欬嗽加桑白皮半夏人參生薑北五味子甘草

然參藥實

若發寒熱加乾生薑牡丹皮柴胡

此少心補元氣散諸虛受病一不通只用生薑薄荷此是婦人

丹皮此水胡

消遙以荷  
荷引即是  
此意

槐花桂心也  
槐與一半以  
治吐衄今人  
難知古法多

若寒熱往來加炮乾薑牡丹皮各二分

若平常些少虛脫肢體瘦倦月信不通以專須通姜子內以薄荷散濟于外只用生薑薄荷此是婦人

常服之藥。滋味寡而性緩効遲而功深。

若大渴加知母石膏

若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

若心腹脹滿加枳殼青皮

虛汗引同陷陰加麻黃根

汗多加浮麥缺氣養心

腸風下血加槐角槐花枳殼荆芥黃芩大腹皮紅內消地梅石楠

藤白鷄冠花為散煎一半為末空心鹽湯新酒有毒舊酒調下故用陳者

鼻衄吐血加竹青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花紅棗飛羅麵白

齊會綱目

卷一調經通用諸方

完



用亦須識之  
以脩泰考

茅根蜂粉

宜密

若頭昏項強似二三者可必加入參黃苓

若虛寒似傷寒者加入參柴胡防風

若虛煩不得睡加竹葉人參

此以四肢腫痛用蒼朮此以諸痛有濕

若諸痛有濕者四物與白朮相半加天麻妙茯苓妙穿山甲用酒煎服

用白朮相半宜思之

治老人風秘通經藥集加青皮分

老人風秘加青皮人所本知產後亦有

治瘡疾加荆芥酒煎常服

用

奶癰加連翹茨菰子紅內消白芷查瓜片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒

藥漏生地黃

赤眼頭風疾加薄荷清茶

即此小

赤眼生風加防風黃苓

脚腫加大腹皮赤小豆黃芩大黃生薑連翹

赤眼生風加防風羌活

風瘡赤腫加荆芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地黃鹽酒

脚腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮

若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者加黃芪白朮茯苓甘草宜

傷寒有六經八物湯

以自汗合桂枝湯也

若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表虛六合湯四物湯四桂枝地骨皮各七錢

以無汗合麻黃加細辛合少陰

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經病宜表實六合四物湯四麻黃細辛各半兩

若妊娠傷寒中風濕之氣脉節煩疼脉浮而熱頭痛此太陽標病

也宜風濕六合湯四物湯四防風蒼朮各七錢

合升麻湯

若妊娠傷寒下後過經不愈溫身發斑如錦紋宜升麻六合四物



湯四柴胡黃芩各七錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛脈弦少陽頭昏項強宜柴胡六合四物湯

合小柴胡四兩柴胡黃芩各七錢

若妊娠傷寒大便鞭小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急

下之宜大黃六合四物湯四兩大黃兩桃仁上黃去皮

以咳嗽而用人參五味今古難之此重在汗下後三字

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止宜人參六合四物湯四兩人參五味

若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合亦治

欬嗽喘滿四物湯四兩厚朴枳實炒各半兩

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合四物湯四兩梔子黃芩

各半兩

合白虎湯

湯四兩石膏知母各半兩

合四苓

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合四物湯四兩茯苓澤瀉各半兩

非仲景法

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合四物湯四兩琥珀茯苓各半兩

仲景無此法

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合四物湯四兩阿膠艾各半兩一方加乾姜甘草黃芪

此仲景法

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合四物湯四兩附子炮去皮桂各半兩

所謂有故無損也

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯四物湯



生地黃大黃

酒浸各半兩

四物與麻黃桂枝白虎柴胡理中四逆柴黃承氣涼膈等皆可作各半湯不能殫述此易老用藥大略也

安胎及漏下血加阿膠大艾甘草蒲黃炒過

以胎漏而加乾姜何也

若胎動不安下血不止每服加艾葉五七片更加葱白阿膠末黃耆減四味之半當歸只用小半如疾勢甚者以四味各半兩細切以水四盞熱艾六塊如鷄子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四服一日令盡一方加粉草乾姜黃芪日二三服至三服以一日

為臘

加阿膠艾葉水煎服名六物湯胎前產後每日可一二服亦治血痢不止腹痛難忍

少或赤或白非時漏下多服有效受胎小腸氣痛加木香砂仁

婦人小腸氣  
者少而胎前  
尤為罕見宜  
識之備驗

衝肝一症尤  
所未聞諸藥  
皆涼而去風  
熱亦瀉肝氣  
也

作惡生寒面  
青皆脾胃不  
足尤宜血之  
以損孕為虛  
宜大補以下  
血為熱宜黃

一。方。加。黃。芪。柏。葉。阿。膠。甘。草。續。斷。治。平。常。經。血。淋。瀉。不。斷。或。多。或。少。或。赤。或。白。非。時。漏。下。多。服。有。效。受。胎。小。腸。氣。痛。加。木。香。懷。香。胎。前。嗽。加。枳。殼。甘。草。款。冬。馬。兜。鈴。牛。夏。木。通。葶。藶。人。參。桔。梗。麥。門。冬。

胎氣衝肝腰膝痠行步艱難加枳殼木通連翹荆芥地黃羌獨山  
梔甘草燈心空心服

妊娠心煩加竹茹一塊

如有敗血則用當歸近上節易白芍藥以赤熟地黃以生

妊娠作惡生寒面青不思飲食憔悴加陳皮枳殼白朮茯苓甘草

損孕下血不止頭痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致加黃芩荆芥牛地

黃赤芍藥生姜



茶須斟酌也

臨產小腹緊痛加紅花滑石汁蘇合香丸

產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

產後腹痛血塊攻腸加大芩沒藥好酒

血塊攻痛失笑散妙

若因產後欲推陳致新補血消諸疾加生薑煎

不知古法而飲治今病真如針針夜行路矣嗟嗟

若產後被驚氣滯神神恍惚敗血月內惡物散少敗血作病或

如針針夜行路矣嗟嗟

脹或疼胸膈痞悶或發寒熱四肢疼痛加玄胡沒藥香白芷與四

物等分為細末淡醋湯或用單便酒調下

妙在調茶

如血風於產後乘虛發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛每四

不羔之加非

物湯中加荆芥穗天麻香附子石菖蒲香各五分每服三錢水一

陽明熱痛不

盞煎至七分服

用膏不可輕

產後傷風頭痛加石膏等甘草半

若產後虛勞日久而脉浮疾者宜柴胡四物湯乃本方與小柴胡

湯合用也

是大法也宜

若產後諸症各隨六經以四物與仲景藥各半服之甚效

產後虛憊發熱煩悶加生地黃

產後腹脹加枳殼肉桂

產後寒熱往來加柴胡麥門冬

產後敗血築心加地骨皮芍藥地骨皮恐未善

產後潮熱加白朮北柴胡甘草牡丹皮地骨皮

產後病眼加北細辛羌活荆芥菊花甘草木賊石決明草決明

產後浮腫氣急腹脹喉中水雞聲加牡丹皮荆芥白朮桑白皮赤

小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑葱白薄荷

如有風熱可加無則不可



失音須明虛

實恐太弱也

則亂須問胎

血有無

骨何風而用

龍骨何也

熟藥亦不蓋

此方不用地

黃前補肝脾

清金制水又

是四物湯之

皮用以此

推之應變無

窮矣

產後失音不語加訶子人參沙蜜百藥煎

產後悶亂加茯神遠志

胎前產後痢後風加乳香龍骨茱萸木香肉桂蒼朮牡丹皮白薇

人參甘草澤蘭大椒懷香煉蜜為丸木瓜酒下

簡易當歸散治經脈不勻或三四月不行或一月再至或腰腿

疼痛不依時而行

當歸 川芎

白芍藥

黃芩 炒各二兩 白朮

山茱萸肉 各一兩半

有為細末空心溫酒調下三錢日三服○或到每服七錢加生

薑水煎服○如冷去黃芩加肉桂○一方有熟地黃

增損四物湯治月事不調心腹疼痛補血溫經駐顏

牡丹皮 各一錢

也 骨皮 一錢

增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血調經

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 白木

牡丹皮 錢各一 地骨皮 一錢

右咬咀作一服川水二鍾煎至一鍾食前服

大溫經湯 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或

崩中去血過多或損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱並者治

之此溫劑內 冷者宜之

當歸 去蘆 川芎 人參 阿膠 碎炒 肉桂 去麁皮

白芍藥 炒 吳茱萸 湯 牡丹皮 甘草 炒各二錢

麥門冬 去心 半夏 生薑湯泡七 二錢半 次二錢半

右剉作一服加生薑五片水煎食前稍熱服

嚴氏抑氣散 治婦人氣盛於血變生諸證頭暈胸滿

此飲翁先生

齊全綱目

卷二 調經通用諸方

二十四



交感丹法也  
氣血有餘方  
可用

配四物更佳  
有熱者須加  
條芩

絕妙好方

前方以黃

香附子四兩

陳皮二兩

挾神去木

甘草

右為末每服二錢食前沸湯調下

四製香附子

治婦人女子經候不調

香附子

擦去皮二分分作四分好酒浸一分鹽水浸一分童便浸一分醋浸一分各三日焙乾

右為細末

醋糊丸如桐子大每服七十九空心食前溫酒下附香

子血中之氣藥也開鬱行氣而血自調何病不瘳婦人宜常服之

十味香附丸

治婦人經候不調

香附

四製一斤當歸

川芎

白芍藥

炒

熟地黃

各四兩

白朮

澤蘭葉

陳皮

各二兩

黃柏

鹽水炒

甘草

炙各一兩

右為末

醋糊丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯下

九味香附丸

治婦人百病皆宜

而涼下此以  
尚香而溫下  
白木又倍于  
煎別是一種  
意見不可說  
有

苟藥是煖子  
宮溫下元之  
品今人不分  
寒熱而與用  
之何哉

前方有玄胡  
索此方有阿  
膠則艾多此

九味香附丸 治婦人百病皆宜

香附子

童便浸一宿再用  
醋煮晒乾炒四兩  
當歸酒洗

川芎

酒洗 芍藥炒

生地黄

酒洗

陳皮

去白各一兩

白朮

酒二兩

黃芩

酒炒一兩二錢

小茴香

炒五錢

右爲末醋糊丸如桐子大空心酒下八九十九熱加地骨皮軟

柴胡

酒浸各一兩

艾附煖宮丸

治婦人經水不調小腹時痛赤白帶下子宮寒冷

香附

四製一斤

艾葉

醋浸炒四兩

當歸

川芎

白芍藥酒炒

生地黄

各一兩

玄胡索

炒二兩

甘草

生用八錢

爲細末

醋糊丸如桐子大每服七八十九米湯酒任下

百子歸附丸

調經養血安胎順氣胎前產後及月事參差有餘

不足諸證悉治久服有驗



艾少行行之  
妙陳石榴酸  
滿當是固經  
之意

稟弱者先天  
之氣弱也血  
生于氣口生  
于下故用熟  
地為君人參  
佐之以生下  
焦之氣使陰  
氣旺而生血  
也臣以烏梅  
以生液而斂  
血入肝大既  
生矣斂矣而  
不為流行之  
則血凝血不  
通故以芍歸  
為佐使於

香附四製十兩 阿膠炒碎 艾葉

芍藥炒 熟地黃酒洗各二兩

當歸酒洗 川芎

右為末用陳石榴一枚連皮搗碎煎水打糊丸如桐子大每服百丸空心淡醋湯下

人參養血丸 治女人稟受素弱血氣虛損當服補衝任調經候

暖下元生血氣

熟地黃五兩 烏梅肉三兩 當歸二兩

人參 川芎

赤芍藥 蒲黃炒各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服八十丸溫酒米飲任下  
當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃各半兩 牡丹皮

也以赤芍破之其或遺也  
以炒蒲黃燻之庶乎生而不寒止而不寒降中有非溫之不熱細玩鐵道之多  
之妙用  
此方妙在分兩之減半雖謂血生於氣旺生火故不多焉  
稽目總方四物湯以下諸丸方并出各有次序各具妙理誠為學

玄胡索

各二錢半

人參

黃芪

各一錢二分半

右為末煉蜜凡如梧子大每服三十九食前米飲下

○治經候先期

先期湯 治經水先期而來宜涼血固經

當歸

白芍藥

炒

生地黃

各二錢

黃檗

炒

知母

炒各一錢

條芩

炒

黃連

炒

川芎

阿膠

炒各八分

艾葉

香附子

甘草

炙各七分

右作一服水二鍾煎一鍾食前溫服

金匱土瓜根散

治帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者

土瓜根

芍藥

桂枝

鹽蠶

各七錢

右四味搗為散酒服方寸匕日三服

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃 各半 牡丹皮



者津液病入  
砭石調劑者

之法也

先期血熱也

艾葉乃溫下

元之藥非先

期所宜而少

加於寒涼之

中者則復具

之義亦有不

必用者有自

酌之

此方補血行

血溫氣破氣

故為氣寒氣

滯者所宜而

脾虛不能生

血以致過期

皆無與也

○治經候過期

只此二方猶為未盡

過期飲

治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當補血行氣

當歸

白芍藥

熟地黃

香附各二錢

川芎錢一

紅花七分

桃仁泥六分

蓬莪朮

木通各五分

甘草各四分

肉桂四分

右作一服水二鍾煎一鍾食前溫服

滋血湯 治婦人心肺虛損血脈虛弱月水過期

人參

黃芪

山藥各一錢

白茯苓去皮

川芎

白芍藥

熟地黃各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

○治經水過多

變如脾肺元氣不足者尤宜

久不止而熱者固宜矣若脾氣下咽血不歸經者不宜如此加法

自古調經每多用之所以暖下元也如下元虛而此方氣降者治之血熱者當不必也

此方不用一

當歸飲即芩朮四物湯

抑陽助陰調理經脉若月水過多別無餘證

當歸酒炒川芎

白芍藥

熟地黃酒蒸白米

黃芩

右剉水煎服○如久不止成血崩者加阿膠炒山梔子炒地榆荆芥甘草或再不止更加搗茅根汁磨墨同服

膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝不止及妊娠調

攝失宜胎氣不安或因損動下血並治

熟地黃

白芍藥各一錢當歸

艾葉各七分阿膠少成

川芎

甘草炙各五分

右剉水煎服

一方加地榆黃芩

丹溪方治婦人稟受弱氣不足攝血故經水來多



紫

味血藥學者  
要知此意

本方以血藥  
治行期以氣  
藥治腹痛重  
在腹痛上妙  
在等分不然  
後三味何以  
用也

此方全在血  
分於花須用  
紅者乃潤燥  
之藥

右到水煎服

治經水澀少

七沸湯 治藥衛虛經水愆期或多或少腹痛二云陰勝陽月候

少者用此

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 蓬朮

川薑 木香 各等分

右每服四錢水一盞半煎至八分溫服

四物加葵花湯 治經水澀少

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 葵花 各二錢

一方又加紅花血見愁

妙在色和一二四勿見易中此也去首當歸是也

一方又加紅花血見秘

右判水煎服

妙在色和二  
字尤妙在加

後二物

四物湯加熟地黃當歸湯 治經水少而色和

四物湯

再加熟地黃

當歸各一兩

右每服一兩水煎服

○治月水不利

牛膝散 治月水不利 臍腹作痛 或小腹引腰氣攻胸膈

牛膝

酒洗一兩

桂心

赤芍藥

桃仁

去皮尖

玄胡索

炒

當歸

酒浸

木香

牡丹皮

各七錢半

右為細末 每服三錢 空心溫酒調下 或五六錢水煎亦可

牡丹散 治月候不利 腹臍疼痛 不欲食

牡丹皮

大黃

炒各一兩

赤茯苓

桃仁

當歸

此證重在疼  
痛不重在不  
欲食如白米  
用治不食則



或可而痛則不可  
不可大黃地黃  
痛則可用而不食不可  
用處方者須得其本

此方只重不相二字與恍惚驚悸絕無相干若因不利而致者則可

生地黃

桂心

赤芍藥

白朮

各七錢半石韋去毛

木香

各五錢

右以咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分空心溫服

養榮湯 治婦人血海虛弱心中恍惚時多驚悸或發虛熱經候

不利

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

青橘皮

薑黃

川薑

五加皮

牡丹皮

海桐皮

白芷

各等分

右剉每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一箇煎至一盞溫服

不拘時

玄歸散

治月經壅滯臍腹滿痛

簡妙在等

據此證俱屬  
脾胃元氣不  
足當用人參  
養榮歸脾補  
中十全之類  
而此亦穩當  
如加參芪更  
佳

當歸

玄胡索 各等分

右為粗末。每服三錢。加生薑三片。水煎稍熱服。

歸漆丸。治月經不利。臍下慙逆。氣腹滿。

當歸 四錢

乾漆 三錢  
炒 令烟盡

右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服十五丸。溫酒下。

○治月水不斷

止經湯。治婦人困倦多睡。少食。經水時時淋瀝。或成片。或下赤

白黃水。面色青黃。頭眩目花。四肢酸疼。此證急宜調理。免致崩漏。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃 各一錢  
白朮

黃芩

阿膠 炒

蒲黃 炒

栝實 各七錢  
香附 一錢



砂仁

甘草 各五分

右作一服加生薑三片水煎空心服

蒲黃散 治血經不止

黃芩

五分

當歸

柏葉

蒲黃

各四分 生薑二分

芫花

一分

生地黄

二十四分

伏龍肝

十二分

石咬咀用水二升煎取八合分二服

固經丸 治經水過多不止乃陰虛挾熱所致法當補陰清熱

黃蘗

白芍藥

各三兩

黃芩

二兩

龜板

炙四兩

構根皮

香附子

童便製各一兩半

右為細末酒糊丸桐子大每五七十九丸白湯下

○治過期不止

此方以生地為主而芫花止用一分又無補氣之藥讀名要知此意  
此丹溪先生法也以肝腎之陰為主四物中止用一知

○山前過期不止

芩心丸 治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不

止。

用米泔入陽明經胃氣也

黃芩 心枝條二兩米泔浸七日炙乾又浸又炙如此七次

右為末醋糊丸如桐子大每服七十九空心溫酒下日進二服

補中葦蕒湯 治風虛冷熱勞傷衝任月水不調崩中暴下產後

失血過多虛羸腹痛或妊娠胎動下血

當歸 乾薑 炮各三兩 川芎 蜜炙 熟地黃 黃芪

人參 杜仲 炒 吳茱萸 炮 甘草 炙各一兩

每服三錢水一鍾半煎至一鍾空心服

芩附湯 補衝任調血氣

止流之藥不難於瀉而難於虛熱尤妙

乾薑 四兩 鹿茸 三兩 當歸 牡蠣 各二兩 附子

齊全圖 卷一 調經通用諸方 三十



於血中之  
氣舉下陷之  
用

此身痛故其  
立法如此  
知身痛腹痛  
自是不同

右每服半碗水二鍾煎八分溫服  
右二方寒者宜之益亦有血海虛寒而不禁者

○治經病疼痛

越痛散 治血氣虛寒身體作痛

虎骨錢五

當歸

芍藥

白朮

茯苓

甘草

續斷

防風

白芷

藁本

附子各三錢

右為粗末每服五錢水二鍾生薑五片棗三枚煎至一盞不拘  
時服此治身痛之劑

八物湯 治經事將行臍腹絞痛者氣滯血凝故也

前四味是血  
後四味是氣  
而川芎血中  
有氣玄胡氣  
中有血不可  
不知

此方又有破  
血破氣血  
行氣藥也將  
來作痛者可  
服

此方治氣多

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

玄胡索

苦練

碎炒各一錢

木香

檳榔各五分

右作一服水煎食前服

加味四物湯治經水將來作疼不止

當歸

酒洗

川芎

各一錢半芍藥炒

熟地黃

玄胡索

蓬朮

醋煮

香附

醋煮各一錢

砂仁八分

桃仁

去皮尖七分

紅花

酒炒五分

右剉水煎服

烏藥湯治血海疼痛

烏藥

一錢半

香附

二錢

當歸

一錢

木香

甘草

炙各五分

右剉水煎服



此全是氣其  
惟血實者宜  
之妙在不用  
血藥

妙在用醋以  
人有行氣也

此顯加味四  
物小異其妙

加味烏藥湯 治婦人經水欲來臍腹痛

烏藥

縮砂

木香

玄胡索

各一兩

香附

妙去毛  
二兩

甘草

炙一兩半

右細剉每服七錢生薑三片水煎溫服

澹寮煮附丸 治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心並

宜服之

香附子

擦去毛不拘多少米醋浸一日用瓦銚煮令醋盡

右為末醋糊丸如桐子大晒乾每服五十丸淡醋湯下

已上三方行滯氣之劑

薑黃散

治血藏久冷月水不調及瘀血凝滯臍腹刺痛

薑黃

白芍藥

炒三兩

當歸

牡丹皮

玄胡索

各二兩

川芎

蓬朮

官桂

細花

又有方地黃而加官桂黃

別方琥珀散有琥珀本方却又無之亦符其功而借名耳此神品藥也而本事方之加減更精

用烏藥玄胡最前

川芎 蓬朮煨切 官桂 紅花各兩

右劉每服一兩水二盞酒少許同煎食前服

琥珀散 治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治產後

惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者

京三稜 蓬朮 赤芍藥 劉寄奴

牡丹皮 熟地黃 真蒲黃炒 當歸

官桂 菊花 各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半掬切片米醋四升同煮至豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服二錢溫酒調下空心食前服○本事云一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衛心二服便下常服



用乳沒以通  
氣血之滯亦  
莫進一步法  
也

若調小便刺  
痛當用牛膝  
陳皮此用枳  
殼何也所宜  
確之

尤佳。予前後收入急切不少亦宜多合以濟人。

玄胡索散。治血氣攻刺疼痛及新舊虛實腹痛。

當歸酒浸 赤芍藥炒 玄胡索 蒲黃隔紙炒 桂皮

乳香木切 沒藥各一錢

右為細末。每服三錢。溫酒空心服。

當歸散。治婦人久積血氣疝痛小便刺痛四肢無力。

當歸 赤芍藥酒少 劉寄奴 枳殼熱炒

玄胡索 沒藥各等分

右為末。熱酒調下二錢。不拘時服。

經方。治婦人臍腹疼痛不省人事。只一服立止。人不知者云。

是心氣痛誤矣。

是心氣痛誤矣

功在五臟然必用之以醋若不通方藥一通一斂皆有妙用

相交為用補不足也

木通皮去

芍藥炒

五靈脂炒各等分

右咬咀每服五錢醋水各半盞煎七分溫服

三神丸治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心䟽經行澀少或經

事不調以致疼痛

橘紅二兩

玄胡索去皮

當歸酒浸畧炒各一兩

右為細末酒煮米糊為丸如梧桐子大每服七十丸加至百丸

空心艾湯送下米飲亦可

交加散治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚

為瘕及產後中風

生地黃

生薑

各五兩各研取汁

右交互取汁浸沽一夕汁盡為度各炒黃末之尋常腹痛酒調



此方與琥珀散不相上下而此有白芍似可

下三錢產後尤不可缺

交加散。治榮衛不和月事湛濁。逐散惡血。治臍腹撮痛腰腿重

墜。

生薑二斤搗取汁存澤用

生地黄二斤搗取汁存澤用

白芍藥

當歸

玄胡索

醋紙包煨熟用布擦去皮

清薑隔紙炒各一斤

桂心

兩

紅花

炒無惡血不用

沒藥

另研各半兩

右將地黄汁炒生薑汁生薑汁炒地黄汁各焙乾同諸藥為細末

每服三錢溫酒調下。若月經不依常蘇木煎酒調下。皆

腰痛糖球子煎酒調下

交加地黄丸。治婦人經不調血塊脹痛肚腹疼。

生地黄

老生薑

各一斤俱另搗取汁存澤

玄胡索

方而有三變矣此又變

家此以三變

當歸

川芎

芍藥

明

而為九而沒  
藥肉桂為一  
家比以三友  
人參桃仁為  
一家亦不甚  
相遠問古人  
友須得古人  
變法乃妙

丹溪治血塊  
多用瓦楞子  
古方治血塊  
多用薑桂熱  
藥而此用大  
黃寒藥宜寒  
宜熱利者別  
之

當歸

川芎

芍藥各二兩

明乳香

木香各兩

桃仁去皮人參各半

香附半斤

右為末。先以生薑汁浸地黃。澤以地黃汁浸生薑。澤晒乾。皆以汁盡為度。其十一味合一處晒乾。研為末。醋糊為丸。空心薑湯下。五七十九。

瓦龍丸 治瘀血作痛

香附醋煮當歸

牡丹

桃仁去皮大黃各二兩

川芎

紅花各半瓦龍子醋煮一

右為末。炊餅丸。空心溫酒下。三四丸。

已上諸方。行瘀血之劑。

桂枝桃仁湯。治經候前。偶感風寒。腹痛不可忍。



即桂枝湯法  
也芍藥用赤  
者妙

要依貼先字  
縮字用藥亦  
奇

溫在冷痛

桂枝

芍藥

生地黄

各二錢

桃仁

去皮尖  
七錢

甘草

炙各  
一錢

右為粗末。生薑三片棗一枚。水煎溫服。

婦人冬月經行。偶值  
歸寧途中。傷冷。遂經止。

不行。腹痛。不可忍。用此藥一  
劑而痛止。經復行。効効如神。

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲。臨經預先腰臍痛。甚則腹中亦

痛。經縮三三日。

柴胡

半錢

羌活

當歸

各錢

生地黄

一分

丁香

四分

全蝎

洗二箇

右剉作一服。水四盞煎至一盞去渣。稍熱食前服。

小溫經湯。治經候不調。臍冷痛。

當歸

附子

炮各等分

右以鹽水煎服。三錢水煎。空心服。

右咳咀每服三錢水煎空心服

沒藥除痛散 逐寒邪療腹痛

蓬朮

煨一兩

當歸

玄胡索

五靈脂

肉桂

去粗皮

良薑

蒲黃

甘草

沒藥

各半兩

右為末分服五錢溫酒服

已上諸方祛風冷之劑

○治經病發熱

逍遙散 治血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥月水不調又主榮衛

不和痰嗽潮熱肢體羸瘦漸成骨蒸

當歸

酒洗

白芍

炒

白朮

白茯苓

白茯苓

此方重在脾  
胃及行肝膽

良薑是脾藥  
肉桂是溫  
經藥



鬱滯故不用  
生地

陽勝則熱知  
肝陰不足而  
肝火獨甚者  
宜之脾胃壯  
者可加胡黃  
連

柴胡各一錢  
甘草炙五分

右加生薑三片麥門冬二十粒去心水煎服不拘時○一方加  
牡丹皮芍子炒名加味逍遙散○一方加知母地骨皮○有嗽  
加桑白皮貝母桔梗知母麥冬○咳血加生地黃山梔牡丹皮  
○嘔吐加陳皮半夏旋覆花○嘈雜加薑炒黃連或茶連二陳  
湯

加味四物湯 治衝任虛損月水不行肌膚發熱如勞瘵狀

當歸 川芎 白芍藥 生地黃各一兩

柴胡半兩 黃芩二錢半

右吹咀每服八錢水煎服○如骨蒸四物湯加地骨皮牡丹皮  
○一方四物湯加胡黃連極効

此方治血不足... 煩熱四服倦怠不進飲食

此治血虛而氣分有虛熱者

六神湯 治血氣不足身體煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 黃芪

地骨皮 各一錢

二方氣血不同學者自當分別

右咬咀水煎空心服

○治往來寒熱

本事方 治婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦

當歸 川芎 黃芪 甘草 官桂 各一兩

熟地黃 白芍藥 白米 各二兩 柴胡 阿膠 碎炒各半兩

右為細末每服五錢棗一枚水煎空心服白湯煎服亦得當承

不生帶下調血脈養子宮終身無病

地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或暗熱內熱

也 按黃芪人參



桂心是補肺  
溫氣藥桑皮  
枳殼地骨皮  
是補肺清熱  
藥白芍茯苓  
是降收之味  
五加前胡是  
行散之味而  
乃並用之重  
在氣虛有火  
當以分兩中  
求之疾若中  
審之則痰妙  
自得參芪自  
木蓋肺脾三  
焦元氣而治  
不欲食零  
牛地清心與  
包絡中火而  
牛血並治口

地骨皮

柴胡各一兩

桑白皮

炒

枳殼

炒

前胡

黃芪

炒各七錢五分

人參

白茯苓

白芍藥

甘草

五加皮

桂心

各半兩

右咬咀每服三五錢水一盞半生薑三片煎七分服

柴胡散

治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡

赤茯苓

黃芪

白朮

各一錢

麥門冬

去心三錢

人參

地骨皮

枳殼

炒

生地黃

桑白皮

赤芍藥

桔梗

甘草

各五分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

七寶湯

治寒熱往來

知母

生地黃

柴胡

七... 治寒熱往來

乾心煩柴胡  
龍甲解骨節

防風去蘆知母 生地黄各半柴胡去蘆

中熱而外散  
赤茯苓芍藥導

前胡去蘆秦艽 甘草炙各二錢半

心火散血熱  
而下行枳桔

右咬咀每服五錢水一盞半加人參三分煎七分服

地骨桑皮瀉  
肺火散結氣

柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱此四物湯與小柴胡

千胸中亦補  
中有瀉之方

湯合方也 日微有寒熱則似痢未甚

也安知不用  
有歸之乃

當歸 川芎 芍藥 熟地黄各一兩半

妙邪在表而  
寒者宜防風

柴胡八錢人參 黃芩 半夏

邪在表而熱  
者宜知母胸中

甘草各三錢

經絡宜前胡  
熱結宜胡

右剉每服一兩生薑三片水煎

寒裏陰陽不  
分之寒熱日

柴胡抑肝散 治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以惡寒發

草人參益氣  
以防解散之

瘧證



虞生地源心  
 以為陽氣  
 宗是方以和  
 結而氣血未  
 虛者宜之  
 此方疎肝開  
 鬱散結氣結  
 血涼心啟服  
 自是一種心  
 此乃越鞠丸  
 之套方也分  
 兩妙  
 此方藏富歸  
 為厥陰肝經  
 鬱火結血之  
 劑  
 按此乃治太  
 陽傳經病益  
 藏血適來則  
 血室虛邪乘

柴胡 二錢  
 青皮 二錢  
 赤芍藥 炒

牡丹皮 各一錢半

蒼朮 米泔浸炒  
 山梔子 炒  
 地骨皮

香附子 各一錢

神麴 八分  
 川芎 七分  
 生地黃

連翹 各五分

甘草 二分

右剉一服水煎空心臨卧服

生地黃丸 治師尼寡婦寒熱如瘧欲男子不得者

生地黃 二兩  
 赤芍藥 一兩  
 柴胡  
 黃芩  
 秦艽 各五錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸煎烏梅湯吞下日三服

○治熱入血室

小柴胡加地黃湯 治婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明爽

夜則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室亦治產後惡露

來忽然斷絕



虛入而為越經  
症然血室與胃  
肝有氣血之分  
故語語有晝夜  
之別目如見鬼  
者以肝臟邪客  
而魂不安本神  
自病也用小柴  
胡以解表裏之  
邪用生地黃以  
涼血中之熱故  
有不愈則又有  
期門之刺其  
加桃仁紅花及  
承氣抵當等湯  
者因其微甚  
而瀉之也同一  
熱入血室寒熱  
也而此不用前  
方反用薑桂牡

來忽然斷絕

柴胡 三錢

半夏

黃芩 各二錢  
人參 一錢半

甘草 五分

生地黃 一錢半

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

四物湯用生地黃加柴胡煎服亦可

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱如癰或狂

言見鬼

柴胡 一錢

桂枝 三分

括藹根 五分

牡蠣 炒

乾薑 炮

甘草 炒各三分

右水煎服汗出而愈

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人者



蠟何歟又與柴

胡桂薑湯不相

上下此但少知

母黃參耳可見

古方增減一味

自有脈絡不可

輕視然其發要

在如瘧并汗出

而愈尋何便

知與前方不同

愈活去也可發

人之智慧此

真是心經藥要

知子母相傳之

理此非執入血

室證乃是血結

胸膈方今集入

此者要以肝胆

脅循候龍也鍼

法俱發汗效

牛黃 二錢半

硃砂

鬱金

牡丹皮 各三錢

腦子

甘草 各一錢

右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服一丸。新水化下。

海蛤散。治婦人傷寒。血結胸膈。宜服此藥。及鍼期門穴。

海蛤

滑石 煅水 飛

甘草 各五錢

芒硝 一兩

右為末。每服二錢。用鷄子清調下。小腸通利其結血自散。更用

桂枝紅花湯。發其汗則愈。







